

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки,
довкілля та сільського господарства
від «__» _____ 2025 року № ____

**Уніфікований список і діагностичні ознаки типів лісу корінних (цільових) деревостанів для рівнинної частини України,
окрім заплавних типів**

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>БОРИ</i>							
Дуже сухий сосновий бір / A ₀ -C	Штучні сосняки (IV–V), низькоповнотні (0,3–0,5), низької товарності	Відсутні	Верхівки горбистих пісків	Дернові, слаборозвинуті, піщані	Відсутній	Цмин пісковий, перстач пісковий, кипець сизий, костриця Беккера, осока колхідська, чебрець повзучий	Фрагментарно у Степу
Сухий сосновий бір / A ₁ -C	Сосняки (III–V), повнотою 0,4–0,6; стовбури дерев збіжисті, сучкуваті	Відсутні	Піщані дюни та ози, заввишки до 20 м і більше, пласкі ділянки, піднесені місцезположення борових терас річок	Полісся: слабогумусовані піски в комплексі з дерново-слабопідзолистими, слаборозвиненими (потужністю 8–10 см) піщаними зі слабкою диференціацією генетичних горизонтів на флювіо-гляціальних або давньоалювіальних	Звичайно відсутній. Зрідка: зіновать руська, дрік красильний, ялівець звичайний	Полісся: булавоносець сіруватий, костриця поліська, костриця овеча, кипець сизий, цмин пісковий, чебрець повзучий, кладонія м'яка, кладонія оленяча, кладонія гачкувата, цетрарія ісландська, зозулин льон волосконосний. Лісостеп: костриця овеча,	Полісся, Лісостеп (Поліський, Придеснянський, Придніпровський, Слобожанський, дуже рідко – Розточ-Опільський райони), Степ



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Висоцький Тарас Миколайович**
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Мінекономіки



69-06/87559-03 від 15.12.2025

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
				відкладах. Лісостеп: дерново-слабопідзолисті, слаборозвинені (потужністю 8–12 см) піщані, з виразним гумусово-елювіальним горизонтом, у комплексі з дерновими слаборозвиненими (потужністю 10–15 см) піщаними ґрунтами на давньоалювіальних відкладах. Степ: дернові слаборозвинені (потужністю 10–15 см) піщані на давньоалювіальних або еолових відкладах		чебрець повзучий, цмин пісковий, аґалік-трава гірська, молодило руське, очиток їдкий, звіробій звичайний, нечуйвітер волохатий, кладонія м'яка, кладонія оленеподібна. Степ: бурачок покручений, віниччя шерстисте, осока колхідська, костриця Беккера, костриця валійська, цмин пісковий, аґалік-трава гірська, кипець сизий, нечуйвітер волохатий, перстач пісковий, кладонія м'яка, кладонія листувата, кладонія оленеподібна	
Свіжий сосновий бір / A ₂ -C	Сосняки (I–III) з домішкою берези повислої	Чисті сосняки (лісові культури), зрідка – березняки	Верхівки піщаних дюн флювіогляціальних і давньоалювіальних арен. У Лісостепу	Полісся: дерново-слабопідзолисті піщані слаборозвинені (потужністю 7–15 см). Лісостеп: дерново-слабопідзолисті	Ялівець звичайний, зіновать руська, верба розмаринолиста, горобина	Полісся: брусниця, верес звичайний, дзвоники круглолисті, котячі лапки дводомні, костриця овеча, куничник наземний, сон широколистий, чебрець	Полісся, Лісостеп, Степ. Найбільш характерні для Полісся й Лівобережного

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
			– рівні або слабохвилясті ділянки борових терас, у Степу – схили високогорбистих кучугурних пісків або рівні ділянки з перевіяними пісками	піщані в комплексі з дерновими піщаними й легкосупіщаними ґрунтами. Степ: слабо гумусовані піски в комплексі з дерновими середньорозвиненими (потужністю 10–20 см). РґВ – 3,0–5,0 м	звичайна	повзучий, цмин пісковий, плаун булавовидний, осока вереснянкова, нечуйвітер волохатий, золотушник звичайний, дикранум багатоніжковий, плевроціум Шребера. Лісостеп: костриця овеча, костриця Беккера, куничник наземний, чебрець повзучий, плаун булавовидний, дикранум багатоніжковий, плевроціум Шребера, зозулин льон ялівцевий. Степ: куничник наземний, костриця валійська, кипець сизий, чебрець повзучий, чебрець Маршалла, цмин пісковий, дикранум багатоніжковий, дикранум мітлоподібний, плевроціум Шребера	Лісостепу, хоча їхня частка в лісовому фонді є порівняно незначною
Вологий сосновий бір / А ₃ -С	Сосняки з домішкою берези (II-III)	Березняки	Рівні знижені місцезонавання між піщаними дюнами у Поліссі, піщаними пагорбами	Полісся: дерново-середньопідзолисті піщані та легкосупіщані глеюваті на флювіогляціальних	Зрідка: горобина звичайна, ялівець звичайний, крушина ламка, верба козяча	Полісся: чорниця, брусниця, верес звичайний, молінія голуба, веснівка дволиста, ожика волосиста, плевроціум Шребера,	Всі лісотипологічні області, найчастіше – у Поліссі. Фрагментарно – на борових піщаних терасах річок

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
			річкових терас Лісостепу й Степу	або давньоалювіальних відкладах. Лісостеп: дерново-слабо- та середньопідзолисті глеюваті в комплексі з дерновими на давньоалювіальних або еолових відкладах. Степ: дернові на давньоалювіальних або еолових відкладах. РґВ – 1-2 м		дикранум багатоніжковий, гілокомій блискучий, зозулин льон звичайний. Від свіжого бору відрізняється відсутністю зіноваті руської, чебрецю повзучого, домінуванням чорниці та наявністю веснівки дволистої, а від сирого бору – відсутністю лохини, андромеди багатолистої та сфагнумових мохів. Лісостеп: брусниця, верес звичайний, ожина волосиста, веснівка дволиста, цмин пісковий, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий, зозулин льон звичайний. Степ: верес звичайний, ожика волосиста, веснівка дволиста, ортілія однобока, суниці лісові, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий, дикранум мітлоподібний	Лісостепу, дуже рідко – у Степу
Сирий	Сосняки (III–IV)	Березняки	Полісся: знижені	Полісся: торф'яно-	Місцями добре	Полісся: лохина, багно	Трапляється зрідка в

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
сосновий бір / А ₄ -С	з поодинокую домішкою берези		місцеположення водно-льодовикових арен у комплексі з мокрими борами, по краю оліготрофних та мезотрофних боліт у вигляді нешироких смуг, рельєф купинястий. Лісостеп: знижені ділянки борових терас річок, западини	болотні, торф'яно-підзолисті глеюваті на гляціальних, флювіогляціальних або давньоалювіальних піщаних відкладах. Лісостеп: торф'яно-болотні, торф'яно-підзолисті глеюваті на давньоалювіальних або еолових піщаних відкладах. РґВ – 0,5-1,0 м	виражений: верби сіра та вушката, зрідка – лапландська, крушина ламка	звичайне, чорниця, брусниця, верес звичайний, журавлина болотна, сфагнум волосистий, сфагнум оманливий, сфагнум загострений, сфагнум магеланський; на мікропідвищеннях – дикранум багатоніжковий, плевроціум Шребера, зозулин льон звичайний, осока здута, осока пухнастоплода, пухівка піхвова, ринхоспора біла. Від мокрого бору відрізняється більшою продуктивністю деревостану, меншим горизонтом торфу, меншою участю гігрофільних видів. Лісостеп: брусниця, верес звичайний, сфагнум болотний, сфагнум круглуватий; на мікропідвищеннях – дикранум багатоніжковий, плевроціум Шребера,	Поліссі і дуже рідко – в Лісостепу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						зозулин льон звичайний, осока здута, осока пухнастоплода, молінія голуба, вербозілля звичайне	
Мокрий сосновий бір / A ₅ -C	Сосняки (V)	Березняки з берези пухнастої	Оліготрофні лісові болота безстічних знижень, мікрорельєф купинястий	Глибокі оліготрофні, верхові й торф'яно-глеюваті торфовища. РГВ – 40–50 см	Розріджений, поодинокі верба вущката	Багно звичайне, лохина, журавлина болотна, журавлина дрібноплідна, пухівка піхвова, росичка круглолиста, андромеда багатоліста, осока багнова, осока здута, шейхцерія болотна; сфагнум оманливий, сфагнум магеланський; на верхівках високих купин: зозулин льон стиснутий	Полісся: фрагментарно; Лісостеп: дуже рідко
Соснове рідколісся дуже мокрого бору / A ₆ -C	Сосняки (V)	Відсутні	Дуже мокрі бори, поширені спільно з мокрими борами або по краях відкритих оліготрофних боліт. Це міжрічкові простори та замкнуті безстічні улоговини,	Торфовища оліготрофні (потужністю 1 м і більше). Торф зазвичай підстиляє грубозернистий пісок. Характерним є верхній шар слаботорфового пухівного сфагнумового торфу	Відсутній	Домінують: пухівка піхвова, журавлина болотна, ринхоспора біла; у домішці: андромеда багатоліста, росичка круглолиста, шейхцерія болотна, осока тонкокореневишна, осока багнова; на мікропідвищеннях: багно звичайне, лохина;	Полісся (Волинська, Рівненська й Житомирська області, фрагментарно в інших областях

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
			утворені між піщаними аренами. Тип місцевості – зандрований, мікрорельєф – купинястий	(потужністю 30–70 см). Зверху залягають нерозкладені та напіврозкладені пачоси переважно з решток сфагнумових мохів (потужністю 10-50 см)		суцільний покрив сфагнумів (гострокінцевого, магелланського, інколи бурого)	
<i>СУБОРИ</i>							
Дуже сухий дубовий субір / B ₀ -Д	Порослеві багатьох генерацій, розімкнені дубняки (Va) з окремими екземплярами груші звичайної, що кушаться, яблуні лісової, береста	Не виявлено	Верхні елементи гідрографічної мережі та присітьові схили	Дернові слаборозвинені (потужністю 20–30 см), щебенюваті ґрунти на пісковиках і глинистих сланцях	Таволга звіробоелиста, зіновать руська, мигдаль степовий, шипшини, глоди	Очиток їдкий, очиток великий, цмин пісковий, кипець сизий, полин пісковий, жабник польовий	Степ – Центральний Донбас
Сухий дубовий субір / B ₁ -Д	Розімкнені порослеві дубняки з дуба звичайного (V–Va). Від B ₀ -Д відрізняються кращим ростом	Не виявлено	Верхні частини бортів балок і річкових долин північної експозиції; круті схили південних експозицій	Дернові малопотужні, щебенювано-супіщані, на рухляку пісковики	Бруслина бородавчата, глоди, кизильник чорноплідний, мигдаль степовий, зіноваті, терен,	Очиток їдкий, очиток великий, цмин пісковий, кипець сий, полин пісковий, жабник польовий, валеріана бульбиста, жовтець іллїрійський, гадючник шестипелюстковий	Степ: дуже рідко на Донецькому кряжі (вздовж берега р. Міус), де займає верхні частини схилів північної експозиції; на крутих

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	супутників дуба – груші та яблуні				свидина криваво-червона		дніпровських схилах південних експозицій
Сухий дубово-сосновий субір / В ₁ -ДС	I ярус: сосна звичайна (I–II); II ярус: дуб звичайний (V). Частіше це старі штучні сосняки (II–III) з поодинокими кущистими дубками	Чисті порослеві дубняки (V) й культури сосни (II–III)	Полісся: переважно рівні або слабохвилясті піщані або супіщані ділянки. Лівобережний Лісостеп: вершини піщаних горбів на борових террасах. Степ: вершини піщаних горбів на борових терасах; відслонення третинних пісків на плакорах та схилах	Полісся: дерново-слабопідзолисті слаборозвинені (потужністю 8-15 см) супіщані або глинисто-піщані з виразним гумусово-елювіальним горизонтом, на гляціальних, флювіо-гляціальних та давньоалювіальних відкладах. РґВ – 3-5 м. Лісостеп: дернові розвинені (потужністю 20–50 см) глинисто-піщані на давньоалювіальних відкладах; дернові щебенювато-кам'янисті ґрунти з глибоким РґВ. Степ: дернові розвинені (потужністю 20–50	Зіновать руська, глоди, барбарис звичайний, терен степовий, бруслина бородавчаста, крушина ламка	Полісся: булавоносець сіруватий, костриця овеча, кипець сизий, цмин пісковий, чебрець повзучий, кладонія м'яка, кладонія оленяча, кладонія гачкувата, зозулин льон волосконосний. Лісостеп: ломиніс прямий, віхалка гілляста, костриця овеча, кипець сизий, цмин пісковий, чебрець повзучий, перестріч лучний, червець однорічний, кладонія м'яка, кладонія оленеподібна. Степ: перстач пісковий, перстач прямий, кипець сизий, звіробій звичайний, молочай кипарисовий, купина запашна, герань криваво-червона, очиток їдкий, тонконіг вузьколистий, золотушник	Зрідка у всіх лісотипологічних районах Степу та південної частини Лівобережного Лісостепу. Фрагментарно у Поліссі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
				см) глинисто-піщані на давньоалювіальних відкладах із глибоким РґВ		звичайний, костриця	
Свіжий дубово-сосновий субір / В ₂ -ДС	Сосняки (І–Іа) з домішкою дуба звичайного, берези повислої, осики, груші звичайної. Інколи другий ярус із дуба звичайного. У правобережному Поліссі: фрагментарно двоярусний сосново-ялиновий деревостан із домішкою дуба звичайного в підліску або в другому ярусі	Полісся, Лісостеп: березняки, дубняки, чисті сосняки; Степ: дубняки, осичники, березняки	Полісся, Лісостеп: рівнинні та слабохвилясті ділянки середніх рівнів або слабопідвищених задрових рівнин річкових терас, низини між піщаними пагорбами. Степ: піщані тераси, рівнинні ділянки, низини між пагорбами і	Полісся: дерново-слабо- і середньопідзолисті супіщані або глинисто-піщані на флювіо-гляціальних відкладах або на елювії гранітів. Лісостеп: розвинені дернові глинисто-піщані та піщані із супіщано-суглинними прошарками на давньоалювіальних відкладах. Степ: розвинені дернові глинисто-піщані на давньоалювіальних відкладах	Полісся, Лісостеп: зіновать руська, дрік красильний, горобина звичайна, іноді ялівець звичайний. Степ: бруслина бородавчаста, клен татарський, барбарис звичайний	Полісся: орляк звичайний, смовдь гірська, буквиця лікарська, куничник очеретяний, брусниця, суниця лісові, грушанка круглолиста, ортилія однобока, вероніка лікарська, верес звичайний, чебрець повзучий, конвалія звичайна, купина запашна, сон широколистий, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий. Відрізняється від свіжого бору наявністю дуба звичайного, грушанки круглолистої, суниць лісових, конвалії звичайної; від вологого субору – присутністю чебрецю повзучого, буквиці лікарської, смовді гірської. Відрізняється від свіжого	Всі лісотипологічні райони Полісся (окрім Придністров'я), Лісостепу й рідше – центрального і північного Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						сугрудю наявністю чебрецю, вересу й відсутністю в деревостані клена гостролистого, липи серцелистої, у підліску – ліщини звичайної, у трав'яно-чагарничковому ярусі – копитняка європейського, яглиці звичайної, медунки темної. Лісостеп: куничник наземний, орляк звичайний, зимолюбка зонтична, конвалія звичайна, ожика волосиста, смовдь гірська, одинарник європейський, купина запашна, вероніка лікарська, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий. Степ: осока вереснянкова, куничник наземний, ожика біла, веснівка дволиста, ортілія однобока, золотушник звичайний, перестріч лучний, пижмо звичайне,	

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						звіробій звичайний, дикранум багатоніжковий, дикранум мітлоподібний, плевроціум Шребера	
Свіжий буково-сосновий субір / В ₂ -бкС	I ярус: сосна звичайна (I); II ярус: дуб звичайний або дуб скельний (III) і бук лісовий (III–IV), інколи домішка з берези повислої та осики	Не виявлено	Рівні ділянки, похилі схили на переході від вузьких долин до височин	Гумусовані піски з тонкими прошарками супісків або примазками суглинку; зрідка – включення щебеню вапняку	Крушина ламка, глід одноматочковий, бруслина бородавчата, горобина звичайна	Буквиця лікарська, смовдь гірська, грушанка круглолиста, перстач білий, ортілія однобока, орляк звичайний, суніці лісові	Лісостеп: фрагментарно (на Опіллі, у верхів'ях Західного Бугу, на Розточчі серед буково-соснових сугрудів), де презентований багатими підтипами
Вологий ялиново-сосновий субір / В ₃ -ялС	I ярус: сосна звичайна з незначною домішкою берези повислої та берези пухнастої й осики (I-II); II ярус: ялина європейська (III) з незначною домішкою дуба звичайного (IV)	Березняки, дубняки, осичники, дубо-березняки	Рівні, дещо знижені ділянки, западини, схили	Дерново-підзолисті (середньо- та сильно-) глинисто-піщані глейові або дерново-глейові та торф'янисто-підзолисті й глейові глинисто-піщані та легкосупіщані на глинисто-піщаних водно-льодовикових відкладеннях	Горобина звичайна, крушина ламка, верби сіра та вушката	Чорниця, брусниця, костяниця, молінія голуба, орляк звичайний, грушанка круглолиста, перестріч лучний, ожика лісова, веснівка дволиста. Зелені мохи: плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий	Полісся: острівні осередки ялини із сосною
Вологий	I ярус: сосна	Дубняки,	Полісся: знижені	Полісся: дерново-	Крушина ламка,	Полісся: орляк звичайний,	Полісся, Лісостеп,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
дубово-сосновий субір / В ₃ -дС	звичайна (І–ІІ) з домішкою берези повислої (І); ІІ ярус: дуб звичайний (ІІІ–ІV), з домішкою осики, граба звичайного, ялини європейської	березняки, чисті сосняки	рівні місцезонавання флювіогляціальних арен, піщаних терас; краї лісових боліт, неглибокі блюдцеподібні западини. Лісостеп, Степ: улоговини між піщаними горбами	середньопідзолисті супіщані, глинисто-піщані, глеюваті на гляціальних, флювіогляціальних або давньоалювіальних відкладах. РґВ – 1,3–2,0 м. Лісостеп: дерново-середньопідзолисті супіщані або глинисто-піщані, глеюваті в комплексі з дерновими супіщаними або глинисто-піщаними розвиненими на давньоалювіальних відкладах. Степ: дернові розвинені супіщані або глинисто-піщані на давньоалювіальних або еолових відкладах	горобина звичайна, верба сіра, рододендрон жовтий (азалія понтійська)	молінія голуба, чорниця, брусниця, веснівка дволиста, верес звичайний, костяниця, перестріч лучний, ожика волосиста, одинарник європейський, ортілія однобока, хвощ лісовий, щитник шартрський, плаун колючий, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий, гілокомій блискучий, птіліум гребінчастий. Лісостеп: орляк звичайний, молінія голуба, чорниця, брусниця, веснівка дволиста, верес звичайний, костяниця, перестріч лучний, ожика волосиста, ортілія однобока, хвощ лісовий, щитник шартрський, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий. Степ: орляк звичайний, брусниця, веснівка дволиста, перестріч	північна частина Степу. Найбільш типовий для Полісся та Лісостепу. Лісовпорядкуванням у Житомирському Поліссі за переважанням у підліску рододендрона жовтого (азалії понтійської) виокремлено тип лісу – вологий дубово-сосновий субір з азалією

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						лучний, ожика волосиста, кунічник очеретяний, плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий	
Сирий дубово-сосновий субір / В ₄ -ДС	Сосняки (І-ІІ) з домішкою осики, берези пухнастої; ІІ ярус: зрідка – дуб звичайний	Сосняки, березняки, осичники, дубняки	Піщані тераси річок, вузькі смуги вздовж країв боліт, замкнені безстічні блюдцеподібні западини; мікрорельєф низькогорбистий	Дерново-підзолисті, піщані або супіщані поверхнево оторфовані (потужністю до 20 см). РГВ – 0,7–1,5 м	Дуб звичайний, горобина звичайна, крушина ламка, верба вушката	Молінія голуба, веснівка дволиста, орляк звичайний, смовдь болотна, вербозілля звичайне, мітлиця біла, ситник розлогий; мохи: плевроціум Шребера, дикранум багатоніжковий, гілокомій блискучий, зозулин льон звичайний	Дуже зрідка – Полісся, Лісостеп, (Подільська та Придніпровська височини, Придніпровська низовина)
Сирий ялиново-сосновий субір / В ₄ -ялС	І ярус: сосна звичайна з домішкою берези пухнастої або осики (ІІІ–ІІ); ІІ ярус: ялина європейська, інколи поодинокі вільха чорна або дуб звичайний (ІV-ІІІ)	Не виявлено	Знижені слабопроточні западини, окраїни мезотрофних боліт	Торф'янисто- і торф'яно-підзолисті глинисто-піщані або легко супіщані; торф'янисто- і торф'яно-болотні; біля осушених площ торфовища перехідного типу	Крушина ламка, горобина звичайна	Чорниця, буяхи, смовдь болотна, молінія голуба, перстач прямостоячий, пухівка піхвова, одинарник європейський, багно звичайне; мохи: зозулин льон звичайний, сфагнум оманливий	Полісся (переважно Західне)
Сирий	Сосняк із	Березняки,	Полісся: низини,	Полісся: дерново-	Горобина	Полісся: кунічник	Полісся, зрідка –

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
березово-сосновий субір / В ₄ -бС	домішкою берези повислої у вигляді рідколісся або поодиноких пригнічених дерев (IV)	зрідка – осичники з домішкою дуба звичайного	слабопроточні улоговини, краї мезотрофних лісових боліт. Лісостеп: улоговини на піщаних терасах	підзолисто- і торф'янисто-підзолисто-глеєві, торф – до 30 см, слаборозкладений (потужністю 0–5 см). Лісостеп: дерново-глеєві. РґВ – 0,8–1,1 м	звичайна, крушина ламка, верба сіра	сивуватий, мітлиця собача, очерет південний, осока видовжена, осока гостра, осока трясучковидна, осока сіра, вербозілля звичайне, шоломниця звичайна, щитник шартрський, теліптерис болотний, ситник розлогий, молінія голуба, смовдь болотна, зозулин льон звичайний, сфагнум круглуватий, сфагнум болотний. Лісостеп: куничник прямий, мітлиця собача, щучник дернистий, осока сіра, вербозілля звичайне, щитник шартрський, хвощ річковий, ситник розлогий, вовконіг європейський, зозулин льон звичайний. Степ: куничник прямий, мітлиця собача, щучник дернистий, вербозілля звичайне, хвощ річковий, ситник розлогий, ситник скупчений, вовконіг	Лісостеп та північна частина Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						європейський, смовдь болотна, зозулин льон звичайний	
Мокрий березово-сосновий субір / В ₅ -бС	Деревостан березово-сосновий (IV)	Березняки з берези пухнастої (V), сосняки	Увігнуті западини, слабопроточні улоговини, низини, перехідні сфагнумові болота	Торфовища перехідні осоково-сфагнумові (потужністю 1 м і більше), зверху слаборозкладені. РГВ – 0,4–0,5 м	Верба сіра, верба вушката, зрідка – крушина ламка	Пухівка піхвова, буяхи, багно звичайне, осока багнова, осока здута, осока пухнастоплода, очерет південний, журавлина болотна, бобівник трилистий, образки болотні, кунічний сивуватий, вербозілля звичайне, перстач болотний, плакун верболистий, ринхоспора біла, ситник розлогий, смовдь болотна, кизляк китицецвітій; мохи: сфагнум магеланський, сфагнум оманливий, сфагнум загострений, зозулин льон стиснутий	Полісся, Лісостеп
Березово-соснове рідколісся дуже мокрого субору / В ₆ -бС	Деревостан березово-сосновий (V)	Відсутні	Краї відкритих осоково сфагнумових боліт, улоговини. Тип місцевості – долинно-зандровий	Торфовища перехідного типу з трав'янисто сфагнумовим торфом (потужністю 25–50 см). РГВ – 10–20 см	Дуже розріджений, з верби сірої	Журавлина болотна, шейцерія болотна, пухівка піхвова, осоки пухнастоплода та багнова, образки болотні, перстач болотний; мохи: сфагнум оманливий з домішкою	Низовини Полісся, Мале Полісся, частково в Лісостепу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						загостреного та звивистого	
<i>СУГРУДИ</i>							
Дуже суха пакленова судіброва / С ₀ -кпД	Дуб звичайний (V) із домішкою ясена звичайного, клена польового, береста, яблуні лісової та груші звичайної	Низькорослі деревостани з клена татарського, із домішкою дуба звичайного	Верхні частини балок південної експозиції та вузькі прибалкові ділянки північних схилів	Дернові розвинені або малопотужні (потужністю до 50 см) чорноземні на рухляку пісковиків і глинистих сланців. У суборуватих підтипах – кам'янисто суглинкові (потужністю до 30 см)	Бруслина бородавчаста бруслина європейська, клен татарський, глоди, кизильник чорноплідний, таволга звіробоелиста	Материнка звичайна, ясенець голостовпчиковий, грястиця збірна, горобейник пурпурово-голубий, перлівка поникла, вероніка волотиста, конюшина гірська, куцоніжка лісова, деревій звичайний, цмин пісковий, костриця валійська, осока Мікелі,	Степ (байрачні ліси Центрального Донбасу)
Суха пакленова судіброва / С ₁ -кпД	Дуб звичайний (V) із домішкою ясена звичайного, клена польового, береста, груші звичайної, яблуні лісової, зрідка – липи серцелистої	Не визначено	У байрачних лісах: середні частини схилів балок південної експозиції й верхні частини північних схилів	Темно-сірі, чорноземи (потужністю 50–60 см) на елювії пісковиків і сланців	Бруслина бородавчаста, бруслина європейська, свидина криваво-червона, бирючина звичайна, крушина ламка, клен татарський, терен степовий, жостір	перлівка одноквіткова, тонконіг дібровний, ясенець голостовпчиковий, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), горобейник пурпурово-голубий, пухирник ламкий, перлівка поникла, перлівка трансільванська, осока рання, вероніка колосиста, очиток великий, цмин пісковий,	Степ: широко розповсюджений тип лісу в Центральному Донбасі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
					проносний	грязиця збірна, горлянка жєневська, лєминіс прямий	
Суха чорнокленова судіброва / С ₁ -ктД	I ярус: дуб звичайний (IV–V); II ярус: клєн татарський, берєст, клєн польовий	Не визначєно	Верхні частини бортів балок південних експозицій, вузькі прибровкові ділянки, зрідка – на вододілах	Чорноземи малопотужні супіщані; дернові малопотужні супіщані на третинних пісках; іноді – темно-сірі лісові, сформовані на пісках	Добре розвинений: клєн татарський, скумпія сумаховидна, бруслина європейська, терєн степовий, глід одноматочковий, шипшина, гордовина, дуже рідко – ліщина звичайна	Переважають злаки: грязиця збірна, костриця овєча, тонконіг вузьколистий. Значну частку мають: гравілат міський, глуха кропива пурпурова, глуха кропива крапчаста, суніці лісові, очиток великий, осока Мікєлі, горобєйник пурпурово-голубий, лєминіс цілолистий, буквиця лікарська	Північна частина Степу
Суха скумпієва судіброва / С ₁ -скД	Сосново-дубові насадження (сосна крейдяна) з ярусом листяних порід: липи серцєлистої, клєнів польового й гостролистого, груші звичайної, яблуні лісової	Не відмічені	Середні й верхні частини схилів південних експозицій із великими ухилами, вздовж вузьких гребєнів	Перегнійно-карбонатні на крейді або мергєлях, третинних зеленкуватих пісках. Можуть бути суглинковими, супіщаними, щєбенювато-пилуватими, кам'янисто-щєбенюватими тощо	Добре розвинений: скумпія сумаховидна, глоди, свидина криваво-червона, шипшина, зіновать руська, крушина ламка	Тонконоги дібровний і вузьколистий, підмарєнник північний, очиток великий, чистець прямий, материнка звичайна, розхідник шорсткий, осока Мікєлі	Степ: лише в околицях м. Святогорськ, на крутому правому берєзі р. Сіверський Донець

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	(IV–V)			(потужністю 35–60 см)			
Суха судіброва з дубом скельним / С ₁ -Дс	Дуби скельний та звичайний з домішкою клена польового, граба звичайного (III–IV)	Культури сосни звичайної та сосни кримської, чагарникові зарості	Круті й похилі схили (стрімкістю 15–30°) південних і західних експозицій	Ясно-сірі лісові або чорноземи малої і середньої потужності, дерново-карбонатні суглинкові (рендзини), змиті, щебенюваті та ін. (потужністю 40–50 см). Інколи бурого кольору, якщо утворилися на елювії силурійських сланців (у Придністров'ї)	Терен, бруслина бородавчаста, гордовина, глоди, шипшини, клен татарський, жимолость татарська	Тонконіг дібровний, материнка звичайна, осоки Мікелі та гірська, горобейник пурпурово голубий, підмаренник справжній, вероніки лікарська і дібровна, перлівка ряба, віхалка гілляста, волошка рейнська. Інколи мохи (дикранум) та епігейні лишайники	Лісостеп: Придністров'я частково, інші частини Поділля
Суха грабова судіброва / С ₁ -ГД	Дуб звичайний із домішкою ясена звичайного та граба звичайного (V)	Чисті дубняки, кленовники	Правий корінний берег Дніпра, верхні частини схилів	Дернові розвинені супіщані на третинних пісках	Бруслина бородавчаста, глоди, клен татарський, терен колючий	Грястиця збірна, тонконіг вузьколистий, вероніка колосиста, материнка звичайна, ластовень лікарський, гравілат міський, перестріч дібровний, пижмо звичайне	Лісостеп: Придніпровська височина; трапляється зрідка
Свіжа пакленова судіброва / С ₂ -кпД	I ярус: дуб звичайний (IV–III) із домішкою ясена звичайного; II ярус: клен польовий з	Не виявлено	Нижні частини бортів балок	Темно-сірі опідзолені (потужністю 30–40 см), щебенювато-суглинкові, суглинково-кам'янисті на пісковіку	Розріджений: бруслини бородавчаста та європейська, свидина криваво-червона,	Грястиця збірна, бугила лісова, копитняк європейський, медунка темна, герань Робертова, пухирник ламкий, яглиця звичайна, конвалія звичайна, ластовень	Північна частина Степу – Донецький кряж

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	домішкою ільмових, груші звичайної, яблуні лісової, липи серцелистої				бирючина звичайна, крушина ламка, терен колючий	лікарський	
Свіжий грабово-дубово-сосновий сугруд / С ₂ -г-дС	I ярус: сосна звичайна (Ia) з домішкою берези повислої або осики; II ярус: дуб звичайний (III–II); III ярус: граб звичайний	Грабо-осичники, порослеві дубняки, березняки, чисті сосняки	Полісся: підвищені рівні місцевиростання та схили широких плакорів. Лісостеп: борові піщані тераси річок, зрідка – третинні піски на вододілах	Полісся: багаті відміни дерново-слабопідзолистих або дерново-середньопідзолистих супіщаних, глинисто-піщаних ґрунтів на супіщаних, глинисто-піщаних гляціальних, флювіо-гляціальних та моренних відкладах. Лісостеп: дерново-слабопідзолисті та дерново-середньопідзолисті супіщані, глинисто-піщані ґрунти в комплексі з дерновими розвиненими ґрунтами на давньооалювіальних відкладах з прошарками супісків,	Ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європрейська, бузина червона, зіновать руська, дрік красильний	Полісся: орляк звичайний, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), костяниця, брусниця, грушанка середня, купина запашна, конвалія звичайна, веснівка дволиста, буквиця лікарська, материнка звичайна, конюшина альпійська, ожика волосиста, суниця лісові, перлівка поникла. Лісостеп: орляк звичайний, конвалія звичайна, веснівка дволиста, перлівка поникла, дзвоники персиколісті, осока волосиста, осока гірська, осока пальчаста, первоцвіт весняний, зірочник великоцвітий (з.	Полісся, Лісостеп

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
				суглинків і глин		ланцетовидний), чина чорна, буквиця лікарська	
Свіжа грабова судіброва / С ₂ -ГД	Дуб звичайний (II–III) із незначною й непостійною домішкою граба звичайного, сосни звичайної, берези повислої, липи серцелистої, клена польового; на змитих чорноземах – домішка ясена звичайного й клена гостролистого	Грабняки, дубняки, дубово-березняки, грабо-дубо-липняки	Схили річкових долин і балок, зрідка – плакори; зазвичай експозиція південна, ухили 6–15° (подекуди 30°)	Сірі лісові щебенюваті легкосуглинкові або супіщані; чорноземи опідзолені; дернові розвинені на щільних породах; дернові слабоопідзолені супіщані. Усі ґрунти є змитими	Зрідка: ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, бузина чорна; Придністров'я: гордовина, кизил справжній, шипшини, клен татарський	Зеленчук жовтий, яглиця звичайна, осоки рання та волосиста, орляк звичайний, грястиця збірна, копитняк європейський, чина весняна, зірочник великоцвітий (з ланцетовидний), купина запашна, герань Робертова, тонконіг вузьколистий, вероніка дібровна, просянка розлога, конвалія звичайна	Полісся й суміжні з ним райони Лісостепу: Подільська й Придніпровська височини
Свіжа грабово-соснова судіброва / С ₂ -Г-сД	Дуб звичайний (II–III), рідше – як домішка дуб скельний, сосна звичайна, граб звичайний, береза повисла, осика, груша звичайна. Зрідка	Чисті сосняки (культури), березняки, осичники	Дещо підвищені рівні або слабохвилясті ділянки, іноді – схили	Дерново-слабопідзолисті супіщані або глинисто-піщані з прошарками суглинків і супісків; підзолисто-дернові на супісках (потужністю 0,6–1,0 м). Часто їх	Горобина звичайна, бруслини бородавчаста і європейська, крушина ламка, глоди, дрік красильний, іноді ліщина	Веснівка дволиста, грястиця збірна, підмаренник запашний, печіночниця звичайна, перестріч дібровний, осока волосиста, осока пальчаста, зеленчук жовтий, фіалка шершава, куцоніжка лісова	Полісся й суміжні з ним райони Лісостепу, Мале Полісся, Розточчя

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	у незначній кількості: липа серцелиста, клен гостролистий, берест, яблуня лісова			підстилають щільні вапнякові породи, граніти або морена	звичайна, свидина криваво-червона		
Свіжа липово-соснова судіброва / С ₂ -Л-сД	І ярус: дуб звичайний, часто із сосною звичайною, березою повислою та осикою; II ярус: липа серцелиста, клени гостролистий і польовий, груша звичайна	Березняки, осичники, липняки, ліщинники	Піщані тераси відслонення третинних пісків, рівнинні ділянки й	Розвинені дерново-слабопідзолисті супіщані ґрунти із суглинковими прошарками на флювіогляціальних і давньоалювіальних відкладеннях	Ліщина звичайна, клен татарський, бруслина бородавчаста, бузина червона, вовчі ягоди звичайні, іноді горобина звичайна	Лісостеп, Полісся: конвалія звичайна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), яглиця звичайна, копитняк європейський, медунка темна, золотушник звичайний, веснівка дволиста, чина весняна, суниця лісові, тонконіг дібровний, первоцвіт весняний, буквиця лікарська, підмаренник північний. Полісся: орляк звичайний, костяниця, ожика волосиста	Лісостеп, Лівобережне Полісся – поза ареалом граба,
Свіжа судіброва з дубом скельним / С ₂ -Дс	Дуб скельний (III-II), з участю дуба звичайного, граба звичайного,	Грабняки, осичники	Схили корінного лівого берега долини Дністра, його приток, інших річок, балок, окремі підвищення	Сірі лісові змиті щебенюваті, перегнійно-карбонатні суглинкові або супіщані; Полісся: підзолисто-дернові	Відсутній опис	Полісся: орляк звичайний, конвалія звичайна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), костяниця, бруслина, чорниця, купина запашна,	Лісостеп: Придністров'я; Полісся: острівці на Словечанському лессовому острові, на Кременецькому

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	клена польового, липи серцелистої, осики, яблуні лісової, груші звичайної, береста			легкосуглинкові		веснівка дволиста, буквиця лікарська, конюшина альпійська, ожика волосиста, суниці лісові, перлівка поникла, фіалка Рейхенбаха. Придністров'я: осока волосиста, осока Мікелі, осока парвська, конвалія звичайна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), молочай мигдалевидний, суниці лісові, перлівка поникла, перлівка ряба, фіалка шершава	кряжі на межі з Малим Поліссям
Свіжа дубово-грабова субучина / С ₂ -д-гБк	Бук лісовий (II–III) із домішкою граба звичайного, дуба скельного, дуба звичайного, кленів польового та гостролистого, явора, берези повислої, осики,	Грабняки, осичники, грабо-березняки, культури сосни	Схили річкових долин, верхівки та схили пагорбів і височин	Дернові розвинені супіщані, підстелені вапняками, пісковиками; сірі лісові суглинкові деградовані (змиті). У прикарпатській смузі: буроземи неглибокі (потужністю 40–60 см)	Ліщина звичайна, вовчі ягоди звичайні, глід кривостовпчиковий, бруслини бородавчаста та європейська, дрік красильний	Орляк звичайний, золотушник звичайний, ожика волосиста, суниці лісові, осики волосиста та парвська, вероніка лікарська, грушанки, тонконіг дібровний, герань криваво-червона, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), підмаренник запашний	Лісостеп: Придністров'я, Прут-Дністровське межиріччя, Хотинська височина, південно-західна частина Поділля

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	черешні пташиної						
Свіжий буково-сосновий сугруд / С ₂ -бкС	Сосна звичайна (Ia), бук лісовий (II–I), граб звичайний як незначна домішка. Супутні породи: дуб звичайний, рідше – дуб скельний, клен гостролистий, береза повисла, липа серцелиста, осика, черешня пташина	Грабняки або буково-березові грабняки, букняки, чисті сосняки	Високі ділянки вододільних плато; рельєф рівний або хвилястий; інколи схилі ділянки	Дерново-слабопідзолисті супіщані (переважно), глинисто-піщані із супіщано-суглинковими прошарками; рендзини. Ґрунтоутворювальні та підстилаючі породи: супіски, вапняки та вапнякові пісковики	Ліщина звичайна, горобина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, вовчі ягоди звичайна, глід кривостовпчик-ковий, бузина червона	Підмаренник запашний, осоки пальчаста і волосиста, веснівка дволиста, фіалка Рейхенбаха, квасениця звичайна, вероніки дібровна і лікарська, зеленчук жовтий, суніці лісові. У домішці постійними видами є: підлісник європейський, переліска багаторічна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), ожика волосиста, міцеліс постінний, медунка темна, горлянка повзуча, копитняк європейський, анемона дібровна, плющ звичайний	Лісостеп: Розточчя, Опілля
Свіжий грабово-сосновий сугруд / С ₂ -гС	I ярус: сосна звичайна (Ia), нерідко – із незначною домішкою берези повислої,	Грабо-осичники, порослєві дубняки, березняки, чисті соснові	Рівні, дещо підвищені ділянки й схили (на Поліссі), тераси річок	Дерново-слабопідзолисті, рідше – середньопідзолисті супіщані на водно-льодовикових або давньоалювіальних	Бузина червона, ліщина звичайна, бруслина бородавчаста, жостір	Орляк звичайний, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), брусниця, медунка темна, зеленчук жовтий, буквиця лікарська, наперстянка	Полісся, Лісостеп: Розточчя; рідше – Волинська та Подільська височини

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	осики (І); ІІ ярус: дуб звичайний (ІІ–ІІІ). За високої повноти І ярусу дуб часто відсутній. ІІІ ярус: граб звичайний	насадження (культури)		супіщаних відкладеннях; іноді підстелені мореною, каолінами або кристалічними породами чи вапняками	проносний, глід кривостовпчиків, вовчі ягоди звичайні, дрік красильний, зіновать руська	великоквітова, серпій увінчаний, костяниця, грушанка зеленоквітова, тонконіг вузьколистий, суниці лісові, купина запашна, веснівка дволиста, конвалія звичайна, копитняк європейський, осоки пальчаста і волосиста, перлівка поникла, чина весняна, печіночниця звичайна, дзвоники скупчені і персиколисті	
Свіжий пристеповий дубово-сосновий сугруд / С ₂ -ДС	І ярус: дуб звичайний (ІІІ) із домішкою сосни звичайної; ІІ ярус: клен, осика, груша звичайна, берест, липа серцелиста	Осичники, дубняки, березняки	Знижені пласкі ділянки піщаних терас	Розвинені чорноземи опідзолені супіщані, на піщаних давньоалювіальних відкладеннях	Клен татарський, бруслини бородавчаста і європейська, верба козяча, калина звичайна, рідше – ліщина звичайна, жимолость звичайна, крушин ламка, зіновать руська, глід одноматочковий	Орляк звичайний, конвалія звичайна, гадючник шестипелюстковий, ранник вузлуватий, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), тонконіг вузьколистий, суниці лісові, буквиця лікарська, перлівка поникла, віхалка гілляста, куничник наземний, дзвоники персиколисті, купина запашна, грястиця збірна, очиток великий,	Переважно Лівобережна частина Північного Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						золотушник звичайний, плевроціум Шребера, дикранум мітлоподібний	
Свіжа степова судіброва / С ₂ -Д	Дуб звичайний (III) із домішкою берези повислої, осики, береста, клена польового	Дубняки, березняки, осичники	Піщані тераси, рівнинні ділянки	Чорноземи опідзолені супіщані	Глід одноматочковий, бруслини європейська та бородавчаста, крушина ламка, клен татарський	Орляк звичайний, грястиця збірна, розхідник плющевидний, яглиця звичайна, золотушник звичайний, холодок лікарський, конюшина альпійська, дзвоники персиколісті	Степ
Волога грабово-соснова судіброва / С ₃ -Г-сД	Дуб звичайний (II-I) із грабом звичайним, осикою, березою повислою, рідше – з липою серцелистою, кленом гостролистим, сосною звичайною (у Поліссі), вільхою чорною	Грабняки, осичники, березняки, сосняки	Рівні або дещо знижені місцевиростання	Полісся: багаті відміни дерново-слабопідзолистих глеюватих і глеєвих супіщаних та глинисто-супіщаних ґрунтів на моренних відкладах або лесовидних суглинках. Лісостеп: борові піщані тераси річок. Придністровська улоговина – дерново-підзолисті суглинкові поверхнево-оглеєні	Крушина ламка, свидина криваво-червона, калина звичайна, ліщина звичайна, бруслина європейська, глід одноматочковий, іноді черемха пташина, верба козяча, рододендрон жовтий (азалія понтійська)	Полісся: квасениця звичайна, веснівка дволиста, орляк звичайний, яглиця звичайна, конвалія звичайна, вербозілля звичайне, щитник чоловічий, безщитник жіночий, просянка розлога, одинарник європейський, осока трясучковидна, підлісник європейський. Лісостеп: квасениця звичайна, веснівка дволиста, орляк звичайний, яглиця звичайна, конвалія	Лісостеп: Придністров'я, Прут-Дністровське межиріччя, Західне Поділля. Полісся: зрідка

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						звичайна, медунка темна, щитник чоловічий, безщитник жіночий, просянка розлога, підлісник європейський	
Волога липово-соснова судіброва / С ₃ -Л-сД	Дубняки (II(I)) із сосною звичайною, березою повислою, липою серцелистою, зрідка – із кленом гостролистим, осикою, вільхою чорною	Осичники, березняки, культури тополі, ялини тощо	Знижені рівні місцеположення, піщані тераси	Дерново-середньопідзолисті супіщані глейові із суглинковими прошарками	Крушина ламка, горобина звичайна, бруслина бородавчаста, черемха пташина, зрідка – ліщина звичайна, калина звичайна, верба сіра	Одинарник європейський, вербозілля звичайне, безщитник жіночий, перстач прямостоячий, конвалія звичайна, яглиця звичайна, купина запашна, просянка розлога, квасениця звичайна, зеленчук жовтий, підмаренник середній	Східна частина Полісся: Придеснянський район (на схід від суцільного поширення граба)
Вологий дубово-сосновий сугруд / С ₃ -дС	I ярус: сосна звичайна (Ia-I) із незначною домішкою осики й берези повислої; II ярус: дуб звичайний; III ярус: липа серцелиста з кленом гостролистим,	Липняки, березняки з берези повислої та пухнастої, осичники, чисті сосняки (культури)	Піщані тераси, знижені рівні місцеположення	Дерново-сильно- або середньопідзолисті глинисто-піщані й супіщані, глеюваті й глейові ґрунти на алювіальних або флювіогляціальних шаруватих відкладеннях. РГВ – 1,2–2,5 м	Горобина звичайна, черемха пташина, крушина ламка, калина звичайна, бруслина бородавчаста, бузина червона	Одинарник європейський, вербозілля звичайне, кислиця звичайна, безщитник жіночий, щитник шартрський, суниці лісові, мерингія трижилкова, конвалія звичайна, грушанки, молінія голуба, купина запашна, яглиця звичайна, копитняк європейський, вербозілля звичайне	Лівобережне Полісся, поза ареалом граба

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	яблунею лісовою						
Вологий буково-сосновий сугруд / С ₃ -бкС	I ярус: сосна звичайна (I–Ia); II ярус: бук лісовий (II (III)) із дубом звичайним; у домішці – явір, береза повисла, осика, липа серцелиста, берест; III ярус: зрідка – граб звичайний	Не виявлено	Невеликі ділянки в зниженнях на плакорах, серед пагорбів, схили плакорів	Ясно-сірі суглинкові, рідше – дерново-підзолисті, або піщані з прошарками супіску й суглинка супіщані	Ліщина звичайна, малина звичайна, горобина звичайна, крушина ламка, вовчі ягоди звичайні, калина звичайна, бузина червона	Чорниця, веснівка дволиста, ожика волосиста, безщитник жіночий, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), цирцея звичайна, квасениця звичайна, фіалка Рейхенбаха, медунка темна, горлянка повзуча, щитник шартрський, фегоптерис з'єднуючий, орляк звичайний, грушанка круглолиста	Лісостеп: Опілля й Розточчя
Волога грабово-соснова сурамінь / С ₃ -г-сЯл	Ялина європейська (I) з домішкою сосни звичайної, берези повислої, осики, дуба звичайного, граба звичайного	Березняки, грабо-березняки, осичники	Рівні або дещо знижені ділянки	Дерново-підзолисті глейові, легкосуглинкові або супіщані на водно-льодовикових відкладеннях, що близько підстиляються прісноводними суглинками; торф'янисто-підзолисті, дерново-глейові супіщані та	Ліщина звичайна, горобина звичайна, бруслина бородавчаста	Квасениця звичайна, чорниця, зеленчук жовтий, грушанки круглолиста та середня, костяниця, щитник шартрський, голокупник дубовий, веснівка дволиста	Полісся: острівні місцезнаходження ялини, переважно в північній частині

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
				суглинкові			
Вологий вербово-тополевий сугруд / С ₃ -вТб	Переважно тополі (І) часто з домішкою у ІІ ярусі в'яза, груші звичайної, інколи дуба звичайного	Чисті в'язівники, інколи дубняки низької продуктивності	Середньовисокі гриви, схили та дещо знижені ділянки прируслової заплави з тривалістю затоплення 40–60 діб	Алювіальні дернові, переважно супіщані, шаруваті, в нижній частині слабogleйові. РґВ – 1,0–1,5 м	Бруслина європейська, вишня магалебська, свидина криваво-червона, крушина ламка, верби сіра та вушката, ожина сиза	Хвощ лісовий, підмаренник чіпкий, розхідник плющевидний, вербозілля лучне, герань Робертова, розрив-трава звичайна	Полісся, Лісостеп, заплави річок
Волога грабова судіброва / С ₃ -гД	Дуб звичайний, осика, граб звичайний, інколи із сосною звичайною, березою повислою (ІІ-І)	Грабняки, осичники, березняки, сосняки	Рівні або дещо зниженні ділянки	Дерново-підзолисті глеюваті та глеєві супіщані, часто на суглинках або із суглинковими прошарками	Крушина ламка, ліщина звичайна, горобина звичайна, бруслина європейська, верба козяча, малина звичайна, калина звичайна	Квасениця звичайна, веснівка дволиста, орляк звичайний, яглиця звичайна, конвалія звичайна, вербозілля звичайне, щитник чоловічий, безщитник жіночий, просянка розлога, а в Поліссі також одинарник європейський, осока трясучковидна, підлісник європейський, щучник дернистий	Полісся, Лісостеп
Волога степова судіброва /	Дубово-соснові деревостани (І) з липою	Осичники, березняки, дубняки	Піщані тераси; знижені рівні ділянки, вузькі	Чорноземи лучні супіщані (потужністю до 80 см)	Клен татарський, шипшини, бруслини	Яглиця звичайна, орляк звичайний, герань Робертова, золотушник	Степ

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
С ₃ -Д	серцелистою, в'язом, березою повислою	чисті	смуги навколо лісових боліт		європейська та бородавчаста, ліщина звичайна	звичайний, кропива дводомна, вербозілля звичайне, хвощ лісовий	
Вологий дубово-липово-сосновий сугруд / С ₃ -д-лС	I ярус: сосна звичайна з незначною домішкою осики або берези повислої (I); II ярус: дуб звичайний; III ярус: липа серцелиста з кленом гостролистим	Липняки, березняки, осичники, сосняки (культури)	Знижені рівні ділянки	Дерново-підзолисті (слабо- і середньопідзолисті) супіщані глеєві та глеюваті ґрунти	Горобина звичайна, бруслини європейська та бородавчаста, бузина червона, черемха пташина, крушина ламка, калина звичайна	Одинарник європейський, вербозілля звичайне, безщитник жіночий, щитник чоловічий, суниці лісові, конвалія звичайна, мерингія трижилкова, грушанка середня, купина запашна, яглиця звичайна, копитняк європейський, родовик лікарський	Лісостеп, Полісся
Сирий дубово-грабово-сосновий сугруд / С ₄ -д-гС	I ярус: сосна звичайна, берези пухнаста та повисла або осики (II); II ярус: дуб звичайний, зрідка – липа серцелиста, явір, а на блюдцеподібних зниженнях – вільха чорна; III ярус: граб	Березняки, осичники, чорновільш-няки	Краї боліт та інші знижені ділянки	Торф'янисто-підзолисто-глейові легкі супіщані, рідше – торф'янисто- та торф'яно-болотні супіщані	Крушина ламка, горобина звичайна, ліщина звичайна, ожина ведмежа, калина звичайна, верба вужката, смородина чорна, іноді черемха пташина, рододендрон жовтий, малина	Молінія голуба, квасениця звичайна, чорниця, одинарник європейський, яглиця звичайна, безщитник жіночий, щитник шартрський, хвощ лісовий, осока трясучковидна, жовтець повзучий, герань Робертова, ситник розлогий, орляк звичайний тощо; інколи у покриві переважають мохи	Полісся, Мале Полісся

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	звичайний				звичайна		
Сира грабова судіброва / С ₄ -ГД	Дуб звичайний із домішкою граба звичайного й вільхи чорної, а на Поліссі – берези пухнастої, осики, інколи сосни звичайної (II-III)	Не виявлено	Займає зниження й ділянки з виразним мікрорельєфом	Дернові сильноглейові слабгумусні суглинкові	Крушина ламка, клен татарський, глід одноматочковий; на Поліссі: верба сіра, горобина звичайна	Ситник розлогий, осоки гостровидна та пухирчаста, незабудка болотна, молінія голуба, жовтець повзучий, хвощ болотний, вербозілля звичайне, гравілат річковий; на мікропідвищеннях: осоки лісова й трясучковидна, щитник шартрський, безщитник жіночий	Придністровська низовина, частково серед інших дібров невеликими ділянками
Сирий ялиново-грабово-сосновий сугруд / С ₄ -ял-ГС	Ялиново-соснові з незначною домішкою берези пухнастої, вільхи чорної (II-III)	Не виявлено	Знижені ділянки, улоговини	Торф'янисто-підзолисті, дерново-підзолисті глейові супіщані на водно-льодовикових відкладеннях. РґВ – 0,4–0,6 м	Крушина ламка, ліщина звичайна, горобина звичайна, рідше – калина звичайна, верба сіра, малина звичайна	Квасениця звичайна, чорниця, безщитник жіночий, веснівка дволиста, буяхи, щитник шартрський, ситник розлогий, герань Робертова та інші види, а також мохи: плевроціум Шребера, колімацій деревовидний, сфагнуми	Полісся – острівні ділянки ялини
Сирий чорновільховий сугруд / С ₄ -Вл	Вільха чорна (I-III) із домішкою берези бородавчастої (берези пухнастої), дуба	Березняки, осичники	Знижені заболочені ділянки в заплавах, безстічні улоговини, неширокі смуги	Лучно-болотні, торф'янисто-болотні, (потужністю 50–80 см). Для лучно-болотних ґрунтів характерною є	Незімкнений. Черемха пташина, калина звичайна, крушина ламка, бузина чорна,	Добре розвинений (проективне покриття часто становить 100 %): шоломниця звичайна, вовконіг європейський, безщитник жіночий, рогіз	Полісся, Лісостеп, Степ

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	звичайного, в'яза, осики, береста, сосни звичайної		країв лісових боліт, притерасні зниження	наявність 10–20 см прошарку торфу, наступним є темно-сірий або чорний ущільнений суглинковий (іноді супіщаний) горизонт, у нижній частині профілю із сизим відтінком (сильне оглеєння). РґВ – 0,5–1 м	клен татарський, верба вушката, ожина сиза, свидина криваво-червона	вузьколистий, осока пухирчаста, комиш лісовий, чистець лісовий і болотний, очерет південний, яглиця звичайна, кропива дводомна, щитник чоловічий, підмаренник болотний, ранник вузлуватий	
Мокрий березово-сосновий сугруд (согра) / С ₅ -бС	Береза пухнаста із сосною звичайною; подекуди домішка вільхи чорної, осики	Не виявлено	Западини у заплавах річок, зниження поблизу озер	Низинні або перехідного типу неглибокі торфовища, зверху торф, слабозрозкладений (потужністю до 15 см). РґВ – 20–40 см	Верби вушката й сіра, крушина ламка, горобина звичайна, інколи черемха пташина й береза приземиста (на Розточчі)	Куничник сивуватий, осока пухирчаста, вербозілля звичайне, смовдь болотна, теліптерис болотний, хвощ річковий, ситник розлогий; мохи: сфагнуми та брієві мохи	Полісся, Мале Полісся, Лісостеп: Розточчя
Мокрий чорновільховий сугруд (мокра сувільшина) / С ₅ -Вл	Вільха чорна з домішкою берези пухнастої та поодинокі – осика, сосна звичайна, ялина європейська	Не виявлено	Уздовж берегів озер, у слабопроточних улоговинах, по краях евтрофних боліт, у заплавах річок	Торф'яно-болотні, торфовища низинні на супіщаних водно-льодовикових відкладеннях. РґВ – 0,3–0,5 м	Крушина ламка, чагарникові верби, калина звичайна, горобина звичайна, смородина чорна	Плакун верболистий, щитник шартрський, теліптерис болотний, очерет південний, осики побережна, гостровидна, здута, частуха подорожникова, підмаренник болотний,	Невеликі площі в Поліссі, зрідка – у Лісостепу і Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						хвощ річковий	
Дуже мокрий вільхово-березовий сугруд / С ₆ -влБ	Вільха чорна (IV) з березою пухнастою, рідше – із сосною звичайною; верби п'ятитичинкова та ламка, невисокої зімкненості	Вербняки, трав'яні асоціації	Окраїни безлісних низинних боліт, безстічні улоговини	Торфовища низинного типу, мулуватоболотні, глибина торфу – 1–2 м, торф слаборозкладений. РГВ – 0,1 м	Верби сіра й тритичинкова, крушина ламка	Бобівник трилистий, очерет південний, осоки побережна, гостровидна, здута, хвощ річковий, плакун верболистий, півники болотні, теліптеріс болотний, образки болотні, куничник сивуватий, лепешняк великий; мохи: сфагнум болотний, дрепанокладус гачкуватозігнутий	Полісся, Придністровська низовина
<i>ГРУДИ</i>							
Дуже суха пакленова діброва / D ₀ -кпД	Дуб звичайний (IV-V) з незначною домішкою береста і клена польового; поодинокі – груша звичайна, ясен звичайний і яблуня лісова	Не визначено	Верхні частини бортів балок південних експозицій	Чорноземи на лесі, лесовидних суглинках, пісковицях (потужністю 80–100 см)	Бруслина бородавчаста, клен татарський, клен польовий, глід одноматочковий, терен колючий	Тонконіг вузьколистий, грястиця збірна, осока Мікелі, ясенець голостовпчиковий, перлівка поникла, куцоніжка лісова, розхідник плющевидний, барвінок трав'янистий, горобейник пурпуровоголубий, горлянка женецька	Північна частина Степової зони, Донецький кряж
Дуже суха діброва з дубом	Дуб пухнастий (IV–V) (зімкненістю	Не визначено	Положисті похилі схили (до 15°) південних і	Дернові лісові розвинені на карбонатних	Скупія сумаховидна (заввишки до 3	Костриця валійська і перлівка трансільванська, рясні осока Мікелі,	Степ: Південний захід Одеської області, на кордоні з

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
пухнастим / D ₀ -Дп	0,4–0,6), порослевого походження, розміщений куртинами, у кущах по 3–12 пагонів		південно-західних експозицій	лесовидних суглинках	м), вишня степова, терен колючий, глід одноматочковий, бруслина європейська, шипшина собача	ластовень лікарський, деревій звичайний, суниці лісові, рутвиця мала; рідко: купина запашна, холодок тонколистий, півники рябі, ломиніс прямий, горицвіт весняний, жовтозілля Якова	Молдовою
Суха діброва з дубом пухнастим / D ₁ -Дп	Дуби пухнастий, звичайний і скельний порослевого походження (IV)	Не визначено	Похилі схили давніх балок	Темно-сірі легкосуглинкові на третинних пісках	Клен татарський, шипшини, жостір проносний, глід одноматочковий, бруслина європейська. Фон утворює скупія сумаховидна. На прогалинах та у вікнах: зарості вишні степової з глодом і зіноватями	Осока Мікелі, вероніка колосиста, рутвиця мала, маруна щиткова, материнка звичайна, гадючник шестипелюстковий, ластовень звичайний, буквиця лікарська, дивина східна, нечуйвітер волохатий, суниці лісові, костриця валійська (типчак)	Степ: Південний захід Одеської області
Суха грабова діброва / D ₁ -гД	I ярус: дуб звичайний (III) із домішкою ясена	Грабняки	Підвищені плато, верхні та середні частини південних схилів, круті схили	Темно-сірі, ясно-сірі опідзолені лісові на лесі (ацидофільний варіант)	Бруслини бородавчаста та європейська, гордовина,	Розхідник плющевидний, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), зеленчук жовтий, копитняк	Лісостеп: Подільська та Придніпровська височини.

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	звичайного або черешні пташиної; II ярус: граб звичайний, берест, липа серцелиста, клени польовий та гостролистий, берека		північної експозиції		ліщина звичайна, свидина криваво-червона, клен татарський, глід одноматочковий, жостір проносний	європейський, горобейник пурпурово-голубий, медунка темна, кропива дводомна, фіалка запашна, чистотіл звичайний, яглиця звичайна, осока волосиста, грястиця збірна, шоломниця висока, підмаренник запашний. Характерними видами, що дають змогу відрізнити суху грабову діброву від свіжої, є горобейник пурпурово-голубий, фіалка шершава, осока Мікелі, перлівка ряба	Степ: виявлено в Донецькій області
Суха чорнокленова діброва / D ₁ -ктД	Дубняки (III–IV) з домішкою клена татарського	Не визначено	Вододіли, середні й верхні частини спади́стих, рідше – пологих і стрімких схилів північних, подекуди південних експозицій	Переважно чорноземи (опідзолені) деградовані або чорноземи лісові на лесовидних карбонатних суглинках із глибиною скипання нижче 50 см, часто скипання не відбувається. В Одеській області значне поширення мають	Скумпія сумаховидна, терен колючий, бруслини європейська і бородавчаста, свидина криваво-червона, глід одноматочковий, шипшини, жостір проносний, іноді	У дуже сухих підтипах домінантним видом є фіалка шершава, у свіжих підтипах – грястиця збірна. Характерний склад: горобейник пурпурово-голубий, костриця валійська (типчак), перлівка трансільванська, глуха кропива крапчаста, купини запашна і багатоквіткова, гравілат	Північна і центральна частини Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
				легкосуглинкові різновиди чорноземів лісових і темно-сірих ґрунтів, сформованих на третинних піщаних відкладеннях	з домішкою гордовини, кизилу справжнього, бузини чорної	міський, хвилівник звичайний, куцоніжка лісова, осока Мікелі, материнка звичайна, рутвиця мала, вероніка дібровна, ломиніс прямий, оман германський, барвінок трав'янистий	
Суха берестово-пакленова діброва / D ₁ -бр-кпД	Дубняки з домішкою ясена звичайного (III–IV)	Дубняки, берестняки	Плaskі, дещо хвилясті плакори, вузькі вододільні плато, схили та береги гідрографічної мережі	Сірі лісові на суглинках, рідше – темно-сірі лісові на третинних пісках, а в Кіровоградській області – чорноземи опідзолені на лесі	Клен татарський, глід одноматочковий, ліщина звичайна, бруслини бородавчаста і європейська, гордовина, терен колючий, жостір проносний	Горобейник пурпурово-голубий, конвалія звичайна, куцоніжка лісова, фіалка дивна, осока рання, буквиця лікарська, гравілат міський, бутень запашний, купина багатоквіткова, холодок лікарський	Північна і центральна частини Степу
Суха діброва з дубом скельним / D ₁ -Дс	I ярус: дуби скельний і звичайний (III–II); II ярус (розріджений) : граб звичайний, черешня пташина, клени польовий і	Чорнокле-новники з невеликою участю дуба звичайного	Хвилясті плакори, підвищені, (присітьові) місцезонавання балкових систем і південні схили балок	Сірі й темно-сірі лісові (опідзолені) середньо-та легкосуглинкові на лесовидних суглинках і третинних пісках	Клен татарський, гордовина, бруслина європейська та бородавчаста, ліщина звичайна, терен колючий, кизил справжній, свидина	Горобейник пурпурово-голубий, осоки волосиста та парвська, тонконіг дібровний, зірочник великоцвітний (з. ланцетовидний), осока Мікелі, перлівка одноквіткова, ломиніс прямий, конвалія звичайна, розхідник	Південні райони, Лісостеп, Придністров'я

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	гостролистий, берека, липа серцелиста, груша звичайна				криваво-червона, глід одноматочковий	плющевидний; у свіжуватому підтипі: копитняк європейський, печіночниця звичайна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), зеленчук жовтий, підмаренник запашний	
Суха кленово-липова діброва / D ₁ -к-лД	Дуб звичайний (III–IV) з домішкою кленів гостролистого та польового, липи серцелистої, ясеня звичайного	Дубняки (IV), кленовники, ясенники	Верхні та середні частини південних схилів балок, верхні частини вододілів	Темно-сірі та сірі лісові суглинкові	Клен татарський, глід одноматочковий, бруслини європейська та бородавчаста	Осока Мікелі, тонконіг дібровний, горобейник пурпурово-голубий, барвінок трав'янистий, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), материнка звичайна, маруна щиткова	Лісостеп, зрідка – у південній частині Полісся
Свіжа грабова діброва / D ₂ -гД	I ярус: дуб звичайний (II–I) із домішкою ясеня звичайного, в'яза шорсткого, берези повислої, осики, явора; II ярус: граб звичайний, липа серцелиста, клени	Грабняки, осичники та лісові культури ялини, сосни, дубняки порослеві	Підвищені місцеположення, плоскі верхні частини вододілів, схили, днища балок	Полісся: багаті відміни дерново-слабопідзолистих суглинкових, на лесовидних суглинках; світло-сірі опідзолені суглинкові на лесовидних суглинках. Лісостеп: сірі лісові суглинкові або глинисті на	Ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, бузина чорна, свидина криваво-червона; зрідка – шипшини, глоди, горобина звичайна, клен	Полісся: зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), копитняк європейський, зеленчук жовтий, печіночниця звичайна, медунка темна, осока волосиста, осока пальчаста, фіалка Рейхенбаха, купина багатоквіткова, підмаренник запашний, підмаренник середній,	Переважно в Лісостепу, рідше – у Поліссі та в північній частині Правобережного Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	гостролистий і польовий, явір, груша звичайна, яблуня лісова			лесовидних суглинках, строкатих неогенових глинах; чорноземи глибокі опідзолені на лесовидних суглинках або строкатих неогенових; рендзини на відслоненнях вапняків. Степ: чорноземи глибокі опідзолені та сірі лісові на лесовидних суглинках	татарський	куцоніжка лісова, анемона дібровна, ряст ущільнений. Лісостеп: осока волосиста, осока пальчаста, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), копитняк європейський, зеленчук жовтий, медунка темна, купина багатоквіткова, підмаренник запашний, фіалка дивна, грястиця збірна, тонконіг дібровний, анемона жовтецева, пшінка весняна, ряст ущільнений, ряст порожнистий. Степ: осока волосиста, осока пальчаста, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), підмаренник запашний, підмаренник чіпкий, гравілат міський, герань Робертова, анемона жовтецева, пшінка весняна, ряст ущільнений, ряст Маршалла, грястиця збірна, буги́ла лісова	

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
Свіжа грабова діброва з дубом скельним / D ₂ -гДс	Дубняки (І) з дуба скельного, дуба звичайного, граба звичайного	Грабняки, осичники, ясенники, культури різних порід	Підвищені вододіли, північні схили плакорів	Темно-сірі й сірі лісові опідзолені, перегнійно-карбонатні суглинкові й глинисті на елювії крейдо-мергелевих порід	Ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, свидина криваво-червона; зрідка – глід одноматочковий, горобина звичайна, клен татарський	Зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), копитняк європейський, зеленчук жовтий, печіночниця звичайна, медунка темна, осоки волосиста і пальчаста, фіалка дивна, купина багатоквіткава, підмаренник запашний, грястиця збірна, гравілат міський, підмаренник середній, тонконіг дібровний, куцоніжка лісова	Лісостеп: Волино-Подільська височина, Придністров'я
Свіжа кленово-липова діброва / D ₂ -к-лД	І ярус : дуб звичайний, ясен звичайний (II–I), зрідка – береза повисла; II ярус: липа серцелиста, клени гостролистий і польовий, берест, в'яз, груша звичайна, яблуня лісова	Дубняки (порослеві), осичники, клено-ліщинники (молодняки)	Плакори й плато, схили різних експозицій (за винятком крутих південних), одвершки балок	Сірі лісові й ясно-сірі лісові середньо- та сильно опідзолені на суглинках та лесовидних суглинках, які близько підстилаються третинними пісками	Ліщина звичайна, бруслини бородавчаста і європейська, свидина криваво-червона, рідше бузина чорна, шипшини, глід одноматочковий, жостір проносний,	Осока волосиста, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), підмаренники чіпкий і запашний, копитняк європейський, розхідник плющевидний, чина весняна, фіалка Рейхенбаха, фіалка дивна, гравілат міський, чистець лісовий, купина багатоквіткава, медунка темна, конвалія звичайна,	Лісостеп і Північний Степ Лівобережжя; переважно Придонецький лісотипологічний сектор

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
					терен колючий	яглиця звичайна	
Свіжа ясеневоліпова діброва / D ₂ -я-лД	Дуб звичайний (І–ІІ) із постійною домішкою ясена звичайного, кленів польового й гостролистого, липи серцелистої, яблуні лісової, груші звичайної, в'яза, береста	Берестняки, кленовники, ясенники, культури різних порід	Плакорні ділянки правих корінних берегів річок і вододільні плато	Сірі й темно-сірі лісові опідзолені, чорноземи опідзолені й вилугувані. Ґрунтоутворювальні породи: леси, лесовидні суглинки та глини	Ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, свидина криваво-червона, бузина чорна, глід одноматочковий	Яглиця звичайна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), осока волосиста, копитняк європейський, підмаренник запашний, розхідник плющевидний, купина багатоквітка, кропива дводомна, гравілат міський, фіалка Рейхенбаха, медунка темна, просянка розлога, чистець лісовий, жеруха бульбиста (зубниця бульбиста), герань Робертова, конвалія звичайна	Північно-східна частина Лісостепу України; переважно Ворскло-Пселський лісотипологічний сектор
Свіжа букова діброва / D ₂ -бкД	І ярус: дуб звичайний (І) з домішкою черешні пташиної, бука лісового, ясена звичайного, зрідка – дуба скельного; ІІ ярус: граб звичайний, явір,	Грабняки, дубняки, осико-березняки, осичники, лісові культури з тополь та ялини	Плакорні ділянки, пагорби, схили долини р. Дністер з ухилом до 10°, мезорельєф слабогорбкуватий, абсолютні висоти – 200–300 м н.р.м.	Сірі лісові на лесовидних суглинках	Слабо виражений: ліщина звичайна, свидина криваво-червона, глід одноматочковий, бруслина бородавчаста, клокичка	Підмаренник запашний, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), копитняк європейський, фіалка Рейхенбаха, осока волосиста, печіночниця звичайна, купина багатоквітка. Трапляються індикатори бучин – жеруха залозиста (зубниця залозиста),	Лісостеп: Подільська височина і Придністров'я, Опілля та Розточчя

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РґВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	клен гостролистий, липа серцелиста, береза повисла				периста (на заході); в Розточ-Опільському районі: з домішкою черемхи пташиної, горобини звичайної, калини звичайної	фегоптерис з'єднуючий, плющ звичайний	
Свіжа грабова бучина / D ₂ -ГБк	І ярус: бук лісовий (І) із домішкою ільма гірського, береста, клена гостролистого, липи серцелистої, дуба звичайного (зрідка – скельного), ясена звичайного, явора, черешні пташиної; ІІ ярус: граб звичайний	Грабняки	Рівні підвищені ділянки плакорів; мезорельєф – похило-хвилястий	Ясно-сірі й сірі лісові, зрідка – темно-сірі та дерново-карбонатні (рендзини)	Дуже розріджений: свидина криваво-червона, вовчі ягоди звичайні, калина звичайна, бруслини бородавчаста і європейська, глід кривостовпчик-ковий, бузина червона; на півночі Опілля: клокичка	Підмаренник запашний, зеленчук жовтий, підлісник європейський, медунка темна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), копитняк європейський, яглиця звичайна, фіалка лісова, герань Робертова, веснівка дволиста, жеруха залозиста (зубниця залозиста), фегоптерис з'єднуючий, плющ звичайний	Лісостеп: Опілля, Розточчя, фрагментами – на Надсянській рівнині

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
					периста, гордовина, вишня степова		
Свіжа берестово-пакленова діброва / D ₂ -бр-кпД	I ярус: дуб звичайний із домішкою ясена звичайного (II-III); II ярус: клени гостролистий та польовий, берест	Дубняки, берестняки, кленовники	Нижні частини берегів балок та їхні днища; пологі схили північної експозиції	Темно-сірі та чорноземи опідзолені на лесі, пісковицях і сланцях	Ліщина звичайна, гордовина, клен татарський, бруслини бородавчаста та європейська, бузина чорна, свидина криваво-червона, бирючина звичайна	Яглиця звичайна, копитняк європейський, вербозілля лучне, ранник вузлуватий, осока волосиста, просянка розлога, медунка темна, розхідник плющевидний, купина багатоквіткова	Центральна та північна частини Степу
Волога грабова діброва / D ₃ -гД	I ярус: дуб звичайний із домішкою клена гостролистого, береста, ясена звичайного, явора, черешні пташиної, липи серцелистої, вільхи чорної (I); II ярус: граб звичайний	Осичники, грабняки, березняки	Рівні, широкі, слабодреновані плакори; пологі схили	Полісся: багаті відміни дерново-слабопідзолистих, опідзолених суглинкових, глеюватих або глейових ґрунтів на суглинковій морені; сірі лісові опідзолені суглинкові та глинисті на лесах і лесовидних суглинках. Лісостеп: сірі лісові	Полісся: крушина ламка, ліщина звичайна, калина звичайна, глід кривостовпчиків, бруслина бородавчаста, бруслина європейська, черемха пташина. Лісостеп: ліщина	Полісся: яглиця звичайна, копитняк європейський, підлісник європейський, безщитник жіночий, герань Робертова, гравілат міський, печіночниця звичайна, квасениця звичайна, зеленчук жовтий, вороняче око звичайне, чистець лісовий, жовтець кашубський, анемона дібровна, ряст ущільнений.	Лісостеп: Волино-Подільська височина, Придністров'я Розточчя, південні райони Полісся

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
				суглинкові або глинисті глеюваті на лесовидних суглинках або строкатих неогенових глинах	звичайна, свидина криваво-червона, бруслина бородавчаста й європейська, глід одноматочковий, бузина чорна	Лісостеп: яглиця звичайна, копитняк європейський, підлісник європейський, кропива дводомна, щитник чоловічий, квасениця звичайна, зеленчук жовтий, цирцея звичайна, вороняче око звичайне, чистець лісовий, просянка розлога, анемона жовтецева, ряст ущільнений, ряст порожнистий	
Волога букова діброва / D ₃ -бкД	I ярус: дуб звичайний і бук лісовий (I-II), можуть домішуватися дуб скельний, ясен звичайний; II ярус: граб звичайний, клени гостролистий і польовий, осика, береза повисла, ільм, липа серцелиста, в'яз	Грабняки, рідко – бучняки, осичники	Нижні положисті частини схилів північної експозиції, тальвеги балок	Сірі лісові глеюваті на лесовидних суглинках та глинисто-піщаних сланцях	Гордовина, ліщина звичайна, кизил справжній, клокичка периста, бузина чорна, глід кривостовпчик-ковий, жостір проносний	Зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), копитняк європейський, молочай мигдалевидний, плющ звичайний, осоки волосиста й парвська, зеленчук жовтий, підмаренник запашний	Лісостеп: Прут-Дністровське межиріччя й Поділля, зрідка

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
Волога грабова бучина / D ₃ -ГБк	I ярус: бук лісовий (I–II) із домішкою в'яза гірського, береста, липи серцелистої, ясена звичайного, дуба звичайного, клена гостролистого, явора, черешні пташиної, вільхи чорної, осики; поодинокі – дуба скельного; II ярус: граб звичайний	Чисті бучняки, грабняки, дуже рідко – березняки (Розточчя)	Місцевиростання рівні та плакорні слабоувігнуті	Сірі лісові, рідше – дерново-карбонатні (рендзини) та темно-сірі лісові на лесовидних суглинках	Розріджений: свидина криваво-червона, жимолость звичайна, бузина чорна, вовчі ягоди звичайні, бруслина європейська, калина звичайна, малина звичайна, гордовина	Квасениця звичайна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), медунка темна, веснівка дволиста, яглиця звичайна, безщитник жіночий, переліска багаторічна, осоки волосиста й лісова, просянка розлога, воронець колосистий та інші	Лісостеп: Опілля та Розточчя, Поділля, Прут-Дністровське межиріччя
Волога дубово-грабова бучина / D ₃ -Д-ГБк	Бук лісовий (I) із домішкою граба звичайного, дуба звичайного, ясена звичайного, клена	Осичники, грабняки, дубняки	Рівні місцевиростання й похилі схили (300-325 м н. р. м.)	Сірі та світло-сірі лісові, підзолисто-бурі лісові (буроземовидні) суглинкові	Вовчі ягоди звичайні, калина звичайна, бузина чорна, малина звичайна, ожина сиза	Безщитник жіночий, яглиця звичайна, копитняк європейський, латук дикий, квасениця звичайна, осоки волосиста та лісова, воронець колосистий, підлісник європейський,	Західний Лісостеп, Полісся

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
	гостролистого, явора, ільма, береста, липи серцелистої					підмаренник запашний, куцоніжка лісова	
Волога кленово-липова діброва / D ₃ -к-лД	Дуб звичайний (І–Іа) (пізня феноформа) з домішкою кленів гостролистого й польового, липи серцелистої, береста, в'яза, інколи – верби козячої, дуже рідко – ясена	Осичники, берестняки, зарості чагарникових верб	Тальвеги глибоких балок правих корінних берегів річок і вододільні плато, де утворилися умови для зволоження завдяки акумуляції поверхневого стоку	Лучні потужні слабопідзолисті намиті; ясно-сірі, сірі та темно-сірі лісові намиті оглеєні на балковому пролювії	Ліщина звичайна, клен татарський, бруслина європейська, крушина ламка, калина звичайна, черемха пташина, глід кривостовпчиків	Яглиця звичайна, кропива дводомна, медунка темна, розхідник шорсткий, підмаренник запашний, купина багатоквіткова, гадючник в'язолистий, гравілат річковий, дудник лісовий, щавель кінський, розрив-трава звичайна; болотні види: вовконіг європейський, череда трироздільна, чистець болотний, вех широколистий	Східний Лісостеп: переважно Придонецький лісотипологічний сектор; рідко – Чернігівське Полісся
Волога ясеневоліпова діброва / D ₃ -я-лД	Дуб звичайний (І) із домішкою ясена звичайного, ільмових, клена польового й гостролистого, липи серцелистої, яблуні лісової	Не виявлено	Нижні увігнуті частини балкових схилів, тальвеги балок	Темно-сірі лісові опідзолені намиті на алювіальних або делювіальних відкладеннях	Ліщина звичайна, клен татарський, бруслини бородавчаста та європейська; як домішка – черемха пташина, свидина криваво-	Яглиця звичайна, копитняк європейський, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), переліска багаторічна, чистець лісовий, тонконіг дібровний, розхідник шорсткий, вербозілля лучне, кропива дводомна, гравілат міський, купина багатоквіткова, чистотіл	Лівобережний Лісостеп: переважно Ворскло-Псельський лісотипологічний сектор

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
					червона, глід, кривостовпчик-ковий, терен колючий	звичайний, медунка темна, бугила лісова, дзвоники кропиволисті	
Волога берестово-пакленова діброва / D ₃ -бр-кпД	Дуб звичайний (І–ІІ, рідше ІІ–ІІІ) із домішкою ясена звичайного, береста, клена польового; трапляються в'яз, ільм, осика	Осичники, кленовники, берестняки	Нижні частини балкових схилів, тальвеги балок	Темно-сірі опідзолені суглинкові й лучні намиті опідзолені потужністю 100–150 см. РГВ – 1,5–2,0 м	Клен татарський, бузина чорна, бруслина європейська, калина звичайна, рідше – ліщина звичайна, жостір проносний, крушина ламка, калина цілолиста (гордовина), свидина криваво-червона	Яглиця звичайна, кропива дводомна, розхідник шорсткий, гравілат міський, щитник чоловічий, бугила лісова, хвилівник звичайний, дзвоники кропиво листі, конвалія звичайна (конвалія травнева), купина багатоквіткова, чистець лісовий, просянка розлога, шоломниця висока, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний)	Північна та центральна частини Степу, Донецький кряж; зрідка – Лісостеп: Слобожанський лісотипологічний район на террасах середнього рівня р. Сіверський Донець
Сира в'язово-ясенева діброва / D ₄ -вз-яД	Дуб звичайний (ІІ–ІІІ) із домішкою ясена звичайного, вільхи чорної, в'яза, береста, рідше – клена польового	Вільшняки, ясенники	Днища балок, підніжжя схилів	Чорноземи оглеєні, деградовані або лучно-болотні з високим рівнем залягання ґрунтових вод. РГВ – 0,5–1,0 м	Клен татарський, бруслина європейська, бузина чорна, свидина криваво-червона, крушина ламка, ліщина звичайна,	Яглиця звичайна, кропива дводомна, безщитник жіночий, хвощ болотний, чистець лісовий, оман високий, вербозілля лучне, гадючник в'язолистий, конвалія звичайна, плетуха звичайна, щитник шартрський, череда	Північна та центральна частини Степу

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
					черемха пташина, ожина сиза, іноді верба сіра	трироздільна, очерет південний	
Сира липово-ясенева діброва / D ₄ -л-яД	Дуб звичайний (II-III) із домішкою липи серцелистої, ясена звичайного, вільхи чорної, осики, кленів гостролистого та польового	Вільшняки, осичники	Глибокі балки, вздовж струмків	Дерново-глеєві	Калина звичайна, черемха пташина, бузина чорна, свидина криваво-червона	Гадючник в'язолистий, кропива дводомна, жовтяниця черговолиста, гірчак перцевий, розрив-трава звичайна, ранник вузлуватий, зірочник дібровний	Лівобережні Полісся (південна частина), Лісостеп
Сира грабова діброва / D ₄ -гД	Дуб звичайний (III) із домішкою вільхи чорної, граба звичайного, осики, рідше – клена гостролистого, ясена звичайного, берези повислої, липи серцелистої, в'яза	Осичники, березо-грабняки	Знижені ділянки, нижні частини схилів, тальвеги балок	Дерново-підзолисті на важкосуглинковій морені; дернові глибокі глейові суглинкові	Ліщина звичайна, крушина ламка, бруслина європейська, черемха пташина, калина звичайна, бузина чорна, свидина криваво-червона	Безщитник жіночий, чистець лісовий, квасениця звичайна, жовтяниця черговолиста, яглиця звичайна, розрив-трава звичайна, жовтець повзучий, гравілат річковий, вербозілля лучне, копитняк європейський, цирцея звичайна, осока трясучковидна, гадючник в'язолистий шорсткий, череда трироздільна, гравілат річковий,	Лісостеп: Волино-Подільська височина, Придністров'я, Розточчя; Південні райони Полісся

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву	Поширення
1	2	3	4	5	6	7	8
						шоломниця звичайна, валеріана лікарська, яглиця звичайна, хвощ великий, осока повисла, м'ята водяна	
Мокрий чорновільховий груд (ольс-болото) / D ₅ -Вл	Вільха чорна, верба п'ятитичинкова; у домішці – ясен звичайний, береза повисла, осика, тополі біла й чорна	Вербняки, осичники	Притерасні зниження, старики, днища балок (місця застою води, що утворилися унаслідок поверхневого стоку, верхів'я ставків, місця виходу джерел)	Глейово-болотні на суглинкових відкладах. РГВ – 0,3-0,5 м	Верби пурпурова, п'ятитичинкова та інші, калина звичайна, черемха пташина	Лепеха звичайна, шоломниця звичайна, гірчак перцевий, жовтяниця черговолиста, вех широколистий, осока здута, гравілат річковий, дягель лікарський, череда трироздільна, рогіз широколистий, чистець болотний, безщитник жіночий, калюжниця болотна	Полісся, Лісостеп, Байрачний Степ

Примітка: 1. Позначки «А», «В», «С» і «D» означають ступені трофності (родючості) ґрунтів, наприклад, А – бір; В – суббір; С – судіброва, субучина, сурамінь, сугруд; D – діброва, бучина, груд.

2. Індекси від 0 до 6 означають ступені вологості ґрунтів, наприклад, 0 – дуже сухий, 1 – сухий, 2 – свіжий, 3 – вологий, 4 – сирий, 5 – мокрий і 6 – дуже мокрий.