

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки,
довкілля та сільського господарства
від «__» _____ 2025 року № ____

Уніфікований список і діагностичні ознаки типів лісу корінних (цільових) деревостанів для Українських Карпат

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Вологий ялиново- (смереково-) сосновий бір / А ₃ -ялС	Сосна звичайна зі смерекою (IV), розташування групове, у домішці – береза повисла	Березняки	Верхній гірський пояс лісу, опуклі верхні й середні частини схилів стрімкістю 15–30°; 900-1 450 м н. р. м.	Ґрунтовий профіль відсутній, дрібнозем у мікророзниженнях і в щілинах скелетних оголень або в кам'янистих розсипах	Рідкий; поодинокі, в місцях ґрунтового субстрату – горобина звичайна	Брусниця, чорниця, верес звичайний, водянка чорна, ожика лісова; лишайники: кладонія оленяча, цетрарія ісландська, кладонія альпійська; мохи: гілокоміум блискучий, дикранум мітлоподібний, плевроціум Шребера, зозулин льон ялівцевий
Вологий гірськососновий бір / А ₃ -Сг	Суцільні зарості із сосни гірської (заввишки 0,5-2,0 м)	Відсутні	Високогірний пояс, всі експозиції, за винятком опуклих і прірвистих південних схилів; 1 400–1 700 м н. р. м.	Слаборозвинені торф'янисто- підзолисті (потужністю 20–25 см), тріщини пісковику, заповнені дрібноземом	Розріджений: горобина звичайна, верба козяча, верба сілезька, ялівець сибірський	Чорниця, брусниця. молінія голуба, водянка чорна, ожика лісова, баранець звичайний; мохи: гілокоміум блискучий, плевроціум Шребера, зозулин льон ялівцевий, дикранум мітлоподібний; лишайники: кладонія оленяча, цетрарія ісландська



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Висоцький Тарас Миколайович**
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Мінекономіки



69-06/87559-03 від 15.12.2025

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Вологий кедрово- ялиновий (смерековий) бір / А ₃ -кЯл	Смерекові насадження з домішкою кедрової сосни європейської (IV) і берези повислої	Березняки	Вершини гір і схили різних експозицій за винятком опуклих форм південних схилів; 1 250–1 450 м н. р. м.	Слаборозвинені кам'янисті торф'яно- підзолисті ґрунти (потужністю до 30 см), сильно скелетні, часто на поверхні виходи пісковиків	Горобина звичайна, верба козяча, верба сілезька, ялівець сибірський	Суцільний килим із чорниці й зелених мохів. Звичайні брусниця, молінія голуба, ожика лісова; види мохів і лишайників як наведено вище для типів лісу А ₃ -ялС і А ₃ -Сг. Часто також трапляються сфагни, інколи
Сирий ялиново- (смереково-) сосновий бір / А ₄ -смС	Переважає сосна звичайна (IV) із низкорослою смерекою європейською та березою повислою	Березняки	Середньогірський пояс Карпат, схили до 15°, переважно північних експозицій; 800–1 100 м н. р. м.	Торф'яно-болотні, часто підзолисті (із шаром торфу до 30 см) на кам'янистих первинних осипах	Розріджений: інколи горобина звичайна, верба козяча, крушина ламка	багно звичайне, журавлина болотна, сфагни, зозулин льон звичайний; трав'яно- чагарничкового ярусу: водянка чорна, буяхи, журавлина болотна, багно звичайне; моховий ярус: гілокоміум блискучий, плевроціум Шребера, птиліум гребінчастий
Сирий гірськососновий бір / А ₄ -Сг	Суцільні зарості із сосни гірської заввишки 0,4–1,2 м	Відсутні	Рівні ділянки або увігнуті форми схилів, переважно на північних експозиціях, стрімкістю до 25°; 1 300–1 800 м н. р. м.	Торф'яно-підзолисті (потужністю 25–30 см)	Відсутній	Сфагни, зозулин льон ялівцевий і зозулин льон звичайний, птиліум гребінчастий, гілокоміум блискучий, плевроціум Шребера; у трав'яно-чагарничковому ярусі: чорниця, водянка чорна, пухівка пихова, багно звичайне, журавлина болотна
Свіжий ялиново- (смереково-) сосновий субір /	I ярус: сосна звичайна (III–IV); II ярус: ялина	Березняки, низкорослі	Переважно схили південних експозицій Покутських гір,	Слаборозвинені гірсько-підзолисті (потужністю до 40	Крушина ламка, верба козяча, ялівець сибірський і ялівець	Чорниця, брусниця, деревій звичайний, мітлиця велетенська, куничник наземний, дзвоники

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
В ₂ -ялС	європейська, береза повисла, інколи – осика		Горган; 500–1 200 м н. р. м.	см), сильноскелетні, з виходом на поверхню пісковиків	звичайний, горобина звичайна; у підросі – ялина європейська та осика	скупчені, котячі лапки карпатські, костриця овеча, очиток карпатський, орляк звичайний, золотушник звичайний, сухоцвіт норвезький, суниця лісові; лишайниковий покрив: цетрарія ісландська та кладонія оленяча; мохи: ніфотріхум сивуватий (ракомітріум сивуватий), плевроціум Шребера, зозулин льон ялівцевий
Свіжий чисто- буковий субір / В ₂ - Бк	Бук лісовий (III– IV), у домішці – поодинокі екземпляри берези повислої	Порослеві букняки, березняки	Північні схили Покутських гір, на Буковині і в Закарпатті; 450–600 м н. р. м.	Неглибокі суглинкові, часто кам'янисті, гірські буроземні (потужністю до 40 см)	Відсутній	Орляк звичайний, кунічник очеретяний, тонконіг дібровний, нечуйвітер волохатий, наперстянка великоквіткова, суниця лісові; мохи: найбільш постійними є зозулин льон ялівцевий, дикранум мітлоподібний
Свіжий дубовий нагірний субір / В ₂ н-Дс	Дуб скельний (III– IV) із незначною домішкою дуба звичайного, берези повислої, груші звичайної	Березняки	Нижньогірська зона Закарпаття й Придністров'я; схили південних експозицій стрімкістю 25° і більше; 150–550 м н. р. м.	Дернові або сірі лісові легкосуглинкові (потужністю до 40 см), сильнозмиті на виходах пісковиків; інколи на виходах	Шипшина, терен колючий, кизил справжній, клен татарський крушина ламка, верба козяча	Орляк звичайний, тонконіг дібровний, полин гіркий, кипець сизий, мітлиця біла, кунічник наземний, дзвоники скупчені, нечуйвітер волохатий, суниця лісові; мохи: зозулин льон ялівцевий та дикранум

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				вапняків		мітлоподібний
Вологий чисто буковий субір / В ₃ -Бк	Бук лісовий (III– IV), у домішці інколи – клен гостролистий, явір	Низькоякісн і порослеві букняки, березняки	Північні експозиції Покутських гір, на Буковині і в Закарпатті; 500–650 м н. р. м.	Дернові або сірі лісові суглинкові, малопотужні, часто кам'янисті	Часто відсутній	Орляк звичайний, вероніка лікарська, ортилія однобока, грушанка круглолиста, ожика лісова, суховершки звичайні, веснівка дволиста, щитник шартрський; мохи: зозулин льон ялівцевий, дикранум мітлоподібний
Вологий ялиново- (смереково-) сосновий субір / В ₃ -ялС	I ярус: сосна звичайна (II–III); II ярус: ялина європейська (III– IV), у домішці – береза повисла	Березняки, ялинники	Схили різних експозицій, за винятком опуклих південних форм; 800–1 100 м н. р. м.	Слаборозвинені кам'янисті гірські буроземи (потужністю до 40 см), рідше – гірськопідзолисті сильноскелетні	Дуже розріджений: крушина ламка, горобина звичайна, верба козяча, верба сілезька, ялівець сибірський	Осока заяча, щитник шартрський, підбілик альпійський, тирлич ваточниковидний, звіробій альпійський, ожика лісова, баранець звичайний, плауни річний і булавовидний, чорниця, пальчатокорінник плямистий; мохи: гілокоміум блискучий, левкобрум сизий, плевроціум Шребера, дикранум мітлоподібний, зозулин льон ялівцевий, птіліум гребінчастий, гілокоміадельфус трикутний (рігідіадельфус трикутний)
Вологий ялицево- ялиновий (смерековий) субір/	Переважає ялина європейська (II– III) із домішкою	Березняки, ялинники	Схили переважно північних і західних експозицій;	Гірсько-підзолисті сильноскелетні малопотужні	Розріджений: крушина ламка, горобина звичайна, верба козяча,	Такі ж

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
В ₃ -яцЯл	ялиці білої (III–IV) і берези повислої		650–1 300 м н. р. м.	(потужністю до 40 см) на елювії-делювії пісковиків	верба сілезька, ялівець сибірський	
Вологий кедрово-ялиновий (смерековий) субір / В ₃ -скдЯл	Переважає ялина європейська (III–IV) із домішкою сосни кедрової європейської (II–III) та берези повислої	Березняки, ялинники	Схили різних експозицій, за винятком опуклих південних форм; 1 300–1 500 м н. р. м.	Слаборозвинені сильноскелетні гірсько-підзолисті з виразним торф'яно-перегнійним горизонтом. Часто на поверхню виходить пісковик, утворюючи кам'янисті розсипи	Підлісок дуже розріджений із крушини ламкої, горобини звичайної, верби козячої, верби сілезької, ялівця сибірського	Окрім вище наведених: перестріч скельний, верес звичайний, багатоніжка звичайна, ожика рівнинна, квасениця звичайна, нечуйвітер чорнуватий, орляк звичайний, лігустик мутеліновий, грушанка круглолиста
Вологий модриново-кедрово-ялиновий (смерековий) субір / В ₃ -мд-скдЯл	Ялина європейська й сосна кедрова європейська із домішкою модрини європейської (II–III), берези повислої	Березняки, ялинники	Південні експозиції, переважно Горгани; 1 000–1 300 м н. р. м.	Слаборозвинені сильноскелетні гірсько-підзолисті з виразним торф'яно-перегнійним горизонтом. Часто на поверхню ґрунту виходить пісковик, утворюючи кам'янисті розсипи	Дуже розріджений: крушина ламка, горобина звичайна, верба козяча, верба сілезька, ялівець сибірський	Окрім вище наведених: баранець звичайний, куничник мінливий, водянка чорна; мохи: дикранум мітлоподібний
Вологий гірсько-сосновий субір (у комплексі із сугрудуватими підтипами) / В ₃ -Сг	Суцільні зарості сосни гірської (заввишки 2–3 м), подекуди з домішкою	Відсутні	Повсюдно; 1 250–1 750 м н. р. м.	Винятково торф'янисто-підзолисті (потужністю до 30 см), на	Верби сілезька та козяча, ялівець сибірський	Окрім вище наведених: незабудка альпійська, жовтець платанолістий

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	низькорослої ялини			грубозернистих пісковицях		
Вологий чистоялиновий (чистосмерековий) субір / В ₃ -Ял	Ялинники (III– IV); у домішці – зрідка береза повисла, інколи ялиця біла, осика	Березняки	Верхній гірський пояс, опуклі схили всіх експозицій стрімкістю 20–30°; 1 000–1 500 м н. р. м.	Гірсько-підзолисті малопотужні (потужністю 20–40 см) на елювії пісковику, сильноскелетні	Розріджений: горобина звичайна, жимолость чорна, верба козяча	Чорниця, брусниця, орляк звичайний, ожика лісова, підбілик альпійський, блехнум колосистий, арніка гірська, одноквіткова одноквіткова, плауни булавовидний і річний, верес звичайний, багатоніжка звичайна, квасениця звичайна, щитник шартрський, тирлич ваточниковидний, нечуйвітер волохатий; мохи: дикранум мітлоподібний, плевроціум Шребера
Вологий зеленовільховий субір (у комплексі із сугрудуватими підтипами) / В ₃ -Влз	Суцільні зарості вільхи зеленої з незначною домішкою смереки, сосни гірської і берези повислої	Відсутні	Повсюдно в Горганах; 1 200–1 600 м н. р. м.	Гірсько-підзолисті з виразним торф'янистим горизонтом	Верби сілезька й козяча, таволга в'язолиста, подекуди – рододендрон східно-карпатський	Чорниця, брусниця, орляк звичайний, ожика лісова, підбілик альпійський, блехнум колосистий, арніка гірська, одноквіткова одноквіткова, плауни булавовидний і річний, верес звичайний, багатоніжка звичайна, квасениця звичайна, щитник шартрський, тирлич ваточниковидний, нечуйвітер волохатий; мохи: дикранум мітлоподібний, плевроціум

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
						Шребера
Вологий кедрово- гірсько-сосновий субір / В ₃ -скдСг	Переважає сосна гірськ (заввишки 2–3 м) із домішкою сосни кедрової європейської та берези повислої	Відсутні	Переважно верхні частини схилів північних експозицій; 1 200–1 500 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Плевроціум Шребера, дикранум мітлоподібний, левкобріум сизий, гілокоміум блискучий, зозулин льон ялівцевий, гілокоміадельфус трикутний (рітідіадельфус трикутний)
Сирий ялиново- (смереково-) сосновий субір / В ₄ -ялС	I ярус: сосна звичайна (III–IV); II ярус: ялина європейська (IV); у домішці – береза повисла, осика	Березняки, ялинники	Переважно нижні частини схилів північних експозицій (зниження); 800–1 000 м н. р. м.	Гірсько-торф'янисті, часто з виходом материнської породи на поверхню (потужність торф'янистої частини – до 50 см)	Розріджений: верби козяча й сілезька, горобина звичайна	Осока жовта, щучник дернистий, щитник шартрський, водянка чорна, пухівка піхвова, плаун булавовидний, буяхи, чемериця Лобелієва, квасениця звичайна, тирлич ваточниковидний, нечуйвітер чорнуватий, багатоніжка звичайна; зрідка: андромеда багатолиста, осоки багнова і здута, бобівник трилистий, журавлина болотна; мохи: гілокоміум блискучий, зозулин льон звичайний, зозулин льон ялівцевий, птилум гребінчастий, гілокоміадельфус трикутний (рітідіадельфус трикутний), аулакомнум болотний, сфагни

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревоостани (клас бонітету)	Похідні деревоостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Сирий чистоялиновий (чистосмерековий) субір / В ₄ -Ял	Ялина європейська (III–IV) із домішкою сосни європейської (II–III), берези повислої, осики	Такі самі	Повсюдно, нижні частини схилів північних експозицій (зниження); 900–1 400 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Осока жовта, щучник дернистий, щитник шартрський, водянка чорна, пухівка піхвова, плаун булабовидний, буяхи, чемериця Лобелієва, квасениця звичайна, тирлич ваточниковидний, нечуйвітер чорнуватий, багатоніжка звичайна; зрідка: андромеда багатоліста, осоки багнова і здута, бобівник трилистий, журавлина болотна; мохи: гілокоміум блискучий, зозулин льон звичайний, зозулин льон ялівцевий, птилум гребінчастий, рітідіадельфус трикутний, аулакомнум болотний, сфагни
Сирий кедрово- ялиновий (смерековий) субір / В ₄ -скдЯл	Ялина європейська (III– IV) із домішкою сосни кедрової європейської (II– III)	Такі самі	Займає верхні частини схилів північних експозицій, стрімкістю 25–30°; 1 100–1 450 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі
Сирий гірсько- сосновий субір / В ₄ -Сг	Суцільні зарості із сосни гірської (заввишки 2–3 м)	Відсутні	Повсюдно в зниженнях і на похилих схилах верхньої межі лісу;	Такі самі	Такий самий	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
			1 250–1 550 м н. р. м.			
Суха нагірна судіброва (із фрагментами сухих дібров) / C ₁ ^н -Дс	Дуб скельний (II– III), у домішці – граб звичайний, рідко – дуб звичайний, клен польовий, береза повисла, черешня пташина	Грабняки, березняки	Південні круті (25– 35°) схили в Придністров'ї та в Закарпатті; 150–300 м н. р. м	Змиті малопотужні (потужністю до 40 см) сірі лісові, рідше – буроземні на лесовидних безкарбонатних супісках або пісковиках, часто деградовані	Розріджений: глід одноматочковий, терен колючий, шипшини	Тонконіг дібровний, ожика волосиста, котячі лапки двodomні, нечуйвітер волохатий, золотушник звичайний, буквиця лікарська, деревій звичайний, вероніка лікарська, пахучка звичайна, дзвоники персиколісті, зіновать руська, анемона дібровна, звіробій альпійський, міцеліс стінний, грястиця збірна, молочай мигдалевидний, фіалка Рейхенбаха; мохи: дикранум мітлоподібний, зозулин льон ялівцевий
Свіжа нагірна судіброва / C ₂ ^н -Дс	Дуб скельний (II– III), рідко – граб звичайний, дуб звичайний, груша звичайна та береза повисла	Грабняки, березняки	Там само, а також Прикарпаття; 300–400 м н. р. м.	Малопотужні буроземні або ясно- сірі лісові з незначним гумусовим горизонтом	Окрім вищенаведених можуть траплятися: ліщина звичайна, скупція сумаховидна, клокичка периста	Ожика волосиста, суниця лісові, веснівка дволиста, грушанка круглолиста, молочай мигдалевидний, осока волосиста, грястиця збірна, герань криваво- червона, дзвоники скупчені, підмаренник запашний, куничник очеретяний, купина кільчаста, вероніка лікарська, жовтозілля Фукса, золотушник звичайний, смілка клейка, зірочник великоцвітий (з.

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревогосп. (клас бонітету)	Похідні деревогосп.	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
						ланцетовидний), анемона дібровна, орляк звичайний, перестріч дібровний, чорниця, брусниця, круціата гола
Свіжа грабова судіброва / С ₂ -гД	Дуб звичайний (II) із невеликою домішкою граба звичайного, клена гостролистого	Грабняки, березняки	Трапляється рідко в передгір'ї Вулканічних Карпат до висоти 300 м н. р. м. і в Придністров'ї	Сірі лісові легко суглинкові або дернові опідзолені, суглинкові, сильнощепенуваті, часто на вапняках (потужністю до 90 см)	Визначений слабо, зрідка: крушина ламка, клени польовий і татарський, терен колючий, ліщина звичайна, клокичка периста	Такі самі
Свіжа ялицева судіброва / С ₂ -яцД	I ярус: дуб звичайний (II–III); II ярус: граб звичайний, ялиця біла, липа серцелиста, береза повисла, осика, клен гостролистий	Грабняки, яличники	Прикарпаття; 250–350 м н. р. м.	Ґрунти буроземні суглинкові, середньопотужні (потужністю до 80 см), на глинистих сланцях, середньощепенуваті	Окрім вищенаведених: бруслина європейська, верба козяча, крушина ламка	Папороті й квасениця звичайна в трав'яно-чагарничковому ярусі відсутні; зрідка: сольданелла гірська, підбілик альпійський, міцеліс стінний; мохи: невеликими плямами трапляються зозулин льон ялівцевий, плевроціум Шребера, дикранум мітлоподібний, гілокоміум блискучий
Свіжа букова судіброва / С ₂ -бкД	Дуб звичайний (II) із домішкою бука лісового, граба звичайного, клена гостролистого,	Грабняки, чисті букняки, березняки	Прикарпаття, Закарпаття, східні й західні експозиції; 300–350 м н. р. м.	Сірі лісові суглинкові середньопотужні (потужністю до 90 см) на лесовидних	Розріджений: ліщина звичайна, свидина криваво-червона, крушина ламка	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	липи серцелистої. Відновлення задовільне, переважно грабом звичайним і буком лісовим			суглинках		
Свіжа нагірна букова судіброва / C ₂ ^н -бкДс	Дуб скельний із буком лісовим (II), у домішці – граб звичайний, дуб звичайний, береза повисла, черешня пташина	Березняки, чисті букняки	Закарпаття, рідше – Прикарпаття та Придністров'я; 300–400 м н. р. м.	Буроземні неглибокі суглинкові й еродовані	Верба козяча, свидина криваво-червона, глід одноматочковий	Такі самі
Свіжа грабова субучина / C ₂ -гБк	Бук лісовий і граб звичайний, у домішці – дуб звичайний, явір, клен польовий, дуб скельний, черешня пташина, берека, береза повисла, осика	Грабняки, березняки, осичники	Закарпаття й Прикарпаття, опуклі частини схилів; 250–600 м н. р. м.	Буроземні неглибокі (потужністю до 60 см), зі слабовизначеним гумусовим горизонтом	Розріджений, у підрості – граб звичайний, бук лісовий	Такі самі
Свіжа ялиново- (смереково-) ялицева субучина / C ₂ -ял-яцБк	Бук лісовий (II) із домішкою ялиці білої, ялини європейської, зрідка – берези	Ялинники, яличники, чисті букняки	Прикарпаття, Закарпаття й Буковина, опуклі форми південних експозицій,	Бурі лісові середньо- щелебенюваті скелетні (потужністю 40–80 см)	Розріджений: бруслина бородавчаста, верба козяча, крушина ламка, ліщина звичайна, горобина звичайна	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	повислої, явора		стімкістю до 35°; 600–960 м н. р. м.			
Свіжа дубово- букова суяличина / С ₂ -д-бкЯц	Ялиця біла (І-ІІ) із домішкою дуба звичайного, бука лісового, граба звичайного, берези повислої, явора	Ялинники, яличники, букняки	Прикарпаття, Закарпаття й Буковина, південні гірські схили; 450–550 м н. р. м.	Дерново-буроземні слабоопідзолені суглинкові на елювії пісковиків або сланців, (потужністю до 80 см), добре дреновані	Горобина звичайна, ліщина звичайна	Такі самі
Свіжа ялиново- (смереково-) букова суяличина / С ₂ -ял-бкЯц	І ярус: ялиця біла (І); ІІ ярус: ялина європейська, береза повисла, бук лісовий, осика	Не виявлено	Середній гірський пояс; 650–1 000 м н. р. м.	Такі самі, часто профіль укорочений у результаті змиву	Такий самий. У підрості – ялиця біла, ялина європейська, бук лісовий	Такі самі
Свіжа буково- ялицева сурамінь (сусмєрєчина) / С ₂ -бк-яцЯл	Ялина європейська (І) із участю (20 %) ялиці білої, бука лісового, у домішці – явір, береза повисла, липа серцелиста	Ялинники, букняки, березняки, осичники	Середній гірський пояс; 800–1 200 м н. р. м.	Буроземні або дерново- слабоопідзолені на елювії або делювії пісковиків (потужність до 1 м)	Бузина чорна й бузина червона	Такі самі
Волога грабова судіброва / С ₃ -гД	Дуб звичайний (ІІІ) із домішкою граба звичайного, клена гостролистого,	Грабняки, дубняки, осичники	Прикарпаття, Закарпаття, Буковина, рівнинні й знижені ділянки; до 450 м н. р. м.	Сірі лісові суглинкові середньопотужні на лесовидних суглинках	Розріджений: ліщина звичайна, свидина криваво-червона, крушина ламка	Щитник чоловічий, голокучник дубовий, ожика лісова, квасениця звичайна, купина кільчаста, чорниця, яглиця звичайна, веснівка дволиста, зірочник

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	липи серцелистої, берези повислої			(потужністю до 1 м), опідзолені й оглеєні		великоцвітий (з. ланцетовидий), грушанка круглолиста, ортілія однобока, костяниця, золотушник звичайний, одинарник європейський, герань лісова, плаун булавовидний, перлівка поникла, чина весняна, орляк звичайний, фіалка дивна, безщитник жіночий, міцеліс стінний, герань Робертова, зніт гірський, молочай мигдалевидний; мохи: євринхіум вузьоклітинний, гілокоміум блискучий, зозулин льон звичайний
Волога ялицева судіброва / С ₃ -яцД	Дуб звичайний (II) із домішкою ялиці білої, граба звичайного, клена гостролистого, явора, липи серцелистої, берези повислої, вільхи чорної	Осичники, яличники, грабняки	Прикарпаття, Буковина; 300–400 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі
Волога букова судіброва / С ₃ -бкД	Дуб звичайний (II) із домішкою бука лісового, граба	Грабняки, букняки, осичники	Прикарпаття, Закарпаття, Буковина;	Дерново-підзолисті або сірі лісові (потужністю до 1 м)	Такий самий	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	звичайного, клена гостролистого, липи серцелистої, осики		250–350 м н. р. м.	на лесовидних суглинкових або давньоалювіальних відкладах		
Волога нагірна грабова судіброва / С ₃ ^н -гДс	І ярус: дуб скельний (II); II ярус: граб звичайний, черешня пташина (зрідка), клени гостролистий і польовий, груша звичайна, липа серцелиста, береза повисла	Грабняки, березняки	Закарпаття; 300–400 м н. р. м.	Буроземні суглинкові середньопотужні, із виразним гумусовим горизонтом	Ліщина звичайна, бруслина бородавчаста, свидина криваво- червона, горобина звичайна, шипшини, верба козяча	Окрім зазначених вище: жеруха бульбиста (зубниця бульбиста), осока лісова, підмаренник запашний, купина багатоквіткова, ранник вузлуватий, живокіст лікарський, безщитник жіночий, квасениця звичайна, жовтець їдкий, материнка звичайна; мохи: постійно ті самі, що й у типах С ₃ -гД, С ₃ -яцД, С ₃ -бкД, часто гілокоміум блискучий
Волога нагірна букова судіброва / С ₃ ^н -бкДс	І ярус: переважає дуб скельний, рідше – бук лісовий (II); II ярус: граб звичайний, береза повисла, осика, липа серцелиста, клен гостролистий	Березняки, грабняки, букняки	Закарпаття; 400–500 м н. р. м.	Такі самі	Розріджений: крушина ламка, горобина звичайна, ліщина звичайна, бруслина бородавчаста	Такі самі
Волога грабова субучина / С ₃ -гБк	І ярус: бук лісовий (II) із дубом	Березняки, грабняки,	Прикарпаття, Закарпаття;	Сірі лісові або дерново-підзолисті	Відсутній	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	звичайним; II ярус: граб звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста, черешня пташина, груша звичайна, яблуня лісова	букняки	до 600 м н. р. м.	(потужністю до 1 м) на лесах або піщано- суглинкових відкладеннях		
Волога чиста субучина / C ₃ -Бк	Бук лісовий із незначною домішкою явора, берези повислої, осики	Березняки, осичники	Закарпаття, Прикарпаття; 600–900 м н. р. м.	Буроземні, кам'янисті, суглинкові, змиті, на глинистих сланцях або пісковицях	Відсутній	Такі самі
Волога грабово- ялицева субучина / C ₃ -г-яцБк	Бук лісовий (II) із домішкою ялиці білої, дуба звичайного (у II ярусі), дуба скельного, явора, берези повислої, граба звичайного	Яличники, букняки, березняки	Закарпаття, Прикарпаття, Буковина; 500–800 м н. р. м.	Дерново-підзолисті, суглинкові або сірі лісові опідзолені (потужністю до 1 м) оглеєні	Розріджений: горобина звичайна	Такі самі
Волога ялицева субучина / C ₃ -яцБк	Бук лісовий (II) із домішкою ялиці білої (II-I)	Ялинники, букняки	Закарпаття, Бескиди; 600–900 м н. р. м.	Гірсько-лісові буроземні слабо- і середньопідзолені (потужністю 80–90 см)	Жимолость чорна, таволга в'язолиста, ліщина звичайна	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Волога ялиново- (смереково-) ялицева субучина (у комплексі з ялиновими (смерековими) субучинами) / С ₃ -ял-яцБк	Бук лісовий (II) із домішкою ялиці білої та ялини європейської	Яличники, ялинники, букняки	Закарпаття, Прикарпаття, Буковина; до 500 м н. р. м.	Гірсько-лісові буроземні (потужністю до 60– 70 см) на глинистих піщанистих сланцях	Розріджений: ліщина звичайна, верба козяча	Такі самі
Волога приполонинна яворова субучина / С ₃ -яврБк	Бук лісовий і явір (II–III)	Явірники, букняки, березняки	Верхні частини гір, схили південної, південно-західної, південно-східної експозицій; 1 000–1 250 м н. р. м.	Буроземні або гірсько-підзолисті середньопотужні на елювії або делювії карпатського флішу	Такий самий	Такі самі
Волога дубово- букова суяличина / С ₃ -д-бкЯц	Ялиця біла (I) із домішкою бука лісового, дуба звичайного, граба звичайного, явора, клена гостролистого, липи серцелистої	Грабняки, осичники, ялинники, букняки	Повсюдно; 400–600 м н. р. м.	Дерново-підзолисті суглинкові на глинистих сланцях; рідше – сірі лісові на карбонатних породах, оглеєні (потужність 60–90 см)	Ліщина звичайна, горобина звичайна, калина звичайна, бузина червона, бруслини бородавчаста та європейська	Такі самі
Волога букова суяличина / С ₃ -бкЯц	I ярус: ялиця біла (I); II ярус: бук лісовий і ялина європейська. У домішці – береза	Ялинники, букняки, осичники, березняки	Повсюдно; 500–1 000 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові (потужністю до 90 см), опідзолені на елювії-делювії карпатського флішу	Горобина звичайна, жимолость чорна, таволга в'язолиста, вовчі ягоди звичайні, смородина карпатська	Квасениця звичайна, постійні атрагена альпійська, сугайник австрійський, жеруха залозиста (зубниця залозиста) і види, притаманні типам С ₃ -гДс,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	повисла, явір та осика					С ₃ -бкДс, С ₃ -гБк; чорниця, брусниця – зрідка; подекуди – мохи
Волога буково- ялицева сурамінь (сушмеречина) / С ₃ -бк-яцЯл	Ялина європейська (I) із домішкою ялиці білої, бука лісового, явора, берези повислої	Березняки, ялинники	Повсюдно; 750–1200 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові щебенюваті та скелетні (потужністю до 60 см)	Горобина звичайна, жимолость чорна, таволга в'язолиста, вовчі ягоди звичайні, смородина карпатська	Такі самі
Волога ялицева сурамінь (сушмеречина) / С ₃ -яцЯл	Ялина європейська (I) із домішкою ялиці білої (20–30 %), рідше – із домішкою явора й берези повислої	Ялинники	Схили північних експозицій; 800–1250 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові ґрунти щебенюваті опідзолені (потужністю до 80	Горобина звичайна, жимолость чорна, таволга в'язолиста	Такі самі, як у типах С ₃ -гДс і С ₃ -бкЯц
Волога високогірна сурамінь (сушмеречина)/ С ₃ -Ял	Ялина європейська (I–II) із невеликою домішкою берези повислої та явора	Березняки	Повсюдно; 1 000–1 500 м н. р. м.	Гірсько-підзолисті, легкосуглинкові на елювії-делювії пісковиків і сланців (потужністю до 50 см), нерозвинені буроземи (до 40 см)	Такі самі, як у типі С ₃ -бкЯц, шипшина альпійська	Суцільний моховий покрив: плевроціум Шребера, дикранум мітлоподібний, зозулин льон ялівцевий, гілокоміадельфус трикутний (рітідіадельфус трикутний), еврinxум вузьоклітинний; квасениця звичайна, підбілик альпійський
Волога кедрова сурамінь (сушмеречина) /	Ялина європейська (II– III) із домішкою	Ялинники	Горгани; 1 000–1 400 м н. р. м.	Такі самі	Горобина звичайна, жимолость чорна, таволга в'язолиста	Сольданелла гірська, щитник шартрський

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
С ₃ -скдЯл	сосни кедрової європейської					
Сира дубова суяличина (у комплексі з дубово- буковою яличиною) / С ₄ -дЯц	Ялиця біла (II) із домішкою дуба звичайного, бука лісового, граба звичайного, вільхи сірої, явора, клена гостролистого; зрідка – ільма, ясена звичайного, липи серцелистої	Осичники, сіровільш- няки	Прикарпаття, Закарпаття, знижені місця вздовж річок і потоків у зоні ялицевих лісів; 400–800 м н. р. м.	Дерново-глеєві на річковому алювії і глинах	Розріджений: бузина чорна, бузина червона, вовчі ягоди звичайні, крушина ламка, ліщина звичайна	Окрім видів, які трапляються в типі С ₄ -ял-бкЯц, часто також представники покриву типу D ₄ ³ -Д
Сира ялиново- (смереково-) букова суяличина / С ₄ -ял-бкЯц	Ялиця біла (II–III) із домішкою ялини європейської, бука лісового, берези повислої, осики	Ялинники	Повсюдно; 450–750 м н. р. м.	Гірсько-лісові буроземні сильнощепенюваті й оглеєні середньо- потужні (потужністю до 70 см) із торф'янисто- перегніним горизонтом	Горобина звичайна, жимолость чорна, верба козяча, таволга в'язолиста	Такі, як у типі С ₃ -д-бкЯц, а також осока рідкоколоса, незабудка болотна, жовтеці повзучий і їдкий, хвощ болотний, вербозілля лучне, гадючник в'язолистий, гравілат річковий, цирцея альпійська
Сира буково- ялицева сурамінь (сумеречина) / С ₄ -бк-яцЯл	Ялина європейська (III) із домішкою ялиці білої і бука лісового у II ярусі	Не виявлено	Повсюдно; 800–1 300 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові суглинкові сильно- щепенюваті оглеєні з розвиненим торф'янисто-	Бузина червона, верба козяча, ліщина звичайна, верба сілезька, горобина звичайна, жимолость	Такі, як у типі С ₄ -ял-бкЯц, а також хвощ великий, щучник дернистий, коручка морозниковидна, калюжниця болотна, теліптерис болотний

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				моховим шаром (потужністю до 20 см)	чорна, таволга в'язолиста	безщитник альпійський. Суцільний моховий покрив із гілокоміуму блискучого, плевроціуму Шребера, евринхіуму вузькоклітинного, гілокоміадельфусу трикутного (рітідіадельфусу трикутного), зозулиного льону звичайного, сфагнумів
Сира чиста сурамінь (сушмеречина) / С ₄ -Ял	Чисті ялинники з домішкою осики й берези повислої	Березняки, осичники	Повсюдно; 750–1 450 м н. р. м.	Буроземи, а також гірсько-підзолисті й торф'яно-болотні	Такі самі, як у типі С ₄ -бк-яцЯл	Такі самі, як у типі С ₄ -ял-бкЯц, а також представники типу D ₄ ³ -Д
Сира сучорновільшина / С ₄ -Вл	Вільха чорна (II) із домішкою берези повислої, осики	Не виявлено	Повсюдно, знижені ділянки; до 650 м н. р. м.	Лучні мулувато- підзолисті, сильно оглеєні на алювіальних відкладах	Розріджений: верба козяча, крушина ламка, горобина звичайна	Гадючник в'язолистий, безщитник жіночий, незабудка болотна, хвощі, підлісник європейський, жовтець повзучий, смовдь болотна, жабрій красивий; мохи: окремими подушками зозулин льон звичайний і зозулин льон ялівцевий, гілокоміум блискучий, плевроціум Шребера, сфагни
Сира сусіровільшина (у комплексі з	Вільха сіра (II) з домішкою смереки, берези	Не відмічені	Заплави гірських річок і потоків; 500–1200 м н.р.м.	Лучні мулувато- підзолисті сильно оглеєні на	Такий самий	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
грудуватими підтипами) / C ₄ -Влс	повислої			алювіальних відкладах		
Свіжа нагірна грабова діброва / D ₂ ^н -гДс	I ярус: дуб скельний (I); II ярус: граб звичайний із домішкою черешні пташиної, кленів, липи серцелистої, зрідка – бука лісового	Грабняки	Закарпаття, рідко – Придністров'я; 150–300 м н. р. м.	Буроземні суглинкові або ясно-сірі лісові з виразним гумусовим горизонтом. Формуються на лесовидних карбонатних суглинках	Ліщина звичайна, бруслина бородавчаста, свидина криваво- червона, вовчі ягоди звичайні, калина звичайна, глід одноматочковий, бузина чорна, горобина звичайна, шипшини	Мегатрофні види: осоки волосиста і лісова, підмаренник запашний, жеруха бульбиста (зубниця бульбиста), медунка темна, розхідник плющевидний, зеленчук жовтий, підлісник європейський, купина багатоквітова, живокіст лікарський, ранник вузлуватий, копитняк європейський, чина весняна
Свіжа грабова діброва / D ₂ -гД	I ярус: дуб звичайний (I); II ярус: граб звичайний. У домішці – клени, груша звичайна, ільм	Грабняки	Повсюдно; 150–300 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі
Свіжа букова діброва / D ₂ -бкД	Дуб звичайний (I) із домішкою бука лісового, дуба скельного, граба звичайного, кленів, ільма, черешні пташиної,	Грабняки, букняки, осичники	Повсюдно; 150–350 м н. р. м.	Буроземні суглинкові потужні або сірі лісові суглинки на лесовидних породах, глинистих і піщаних сланцях	Розріджений: ліщина звичайна, бруслини бородавчаста та європейська, свидина криваво-червона, калина звичайна, глід одноматочковий, вовчі	Такі самі, як у типі D ₂ -гД, а також переліска багаторічна, купина запашна, чина весняна, печіночниця звичайна, тонконіг дібровний. Мохи відсутні, або наявні невеликими групами в зниженнях, біля старих пнів

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	береки, берези повислої та осики				ягоди звичайні	
Свіжа нагірна букова діброва / D ₂ ^н -бкДс	Дуб скельний (І) із домішкою бука лісового та інших порід, відзначених у типі D ₂ -бкД	Грабняки, букняки, осичники	Закарпаття – дуже рідко, Придністров'я; 150–300 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі
Свіжа грабова бучина / D ₂ -гБк	Бук лісовий (Іа) із домішкою дуба звичайного, граба звичайного, ясена звичайного, явора, клена гостролистого, липи серцелистої, черешні пташиної	Грабняки, дубняки, ялинники	Повсюдно; до 500 м н. р. м.	Лісові опідзолені буроземні потужні на вапняках і глинисто- піщаних сланцях, інколи – сірі лісові суглинкові на лесовидних суглинках	Такий самий	Слаборозвинений: купина запашна, чина весняна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидий), плющ звичайний, шавлія залозиста, гравілат міський, щитник чоловічий, підмаренник середній, осока волосиста, копитняк європейський, воронець колосистий, вороняче око звичайне, голокучник дубовий
Свіжа чиста бучина / D ₂ -Бк	Бук лісовий (І) із домішкою явора, ільма	Ялинники, грабняки	Передгірний і нижній гірський пояси, південні опуклі схили; 400–800 м н. р. м.	Буроземні гірсько- лісові опідзолені суглинкові (потужністю до 120 см) на елювії пісковиків і глинистих сланців	Слаборозвинений: поодинокі вовчі ягоди звичайні, бузина чорна й бузина червона	Такий самий
Свіжа ялицева бучина / D ₂ -яцБк	Бук лісовий (І–ІІ) із домішкою ялиці	Яличники, ялинники	Повсюдно; 650–900 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові опідзолені	Горобина звичайна, бузина червона,	Такі самі, як у типах D ₂ -гБк і D ₂ -Бк, а також булатка

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	білої, ялини європейської			суглинкові (потужністю до 120 см) на елювії-делювії карпатського флішу	жимолость чорна	довголиста, барвінок малий, веснівка дволиста, молочай мигдалевидний
Волога грабова діброва / D ₃ -гД	I ярус: дуб звичайний (I) із домішкою кленів, липи серцелистої, черешні пташиної, ільма; II ярус: граб звичайний	Грабняки	Повсюдно до висоти 500 м н. р. м.	Сірі лісові опідзолені потужні (потужністю понад 1,3 м) на лесовидних суглинках (карбонатних і безкарбонатних) і глинах, часто оглеєні	Слаборозвинений: ліщина звичайна, свидина криваво- червона, бруслина бородавчаста, калина звичайна, вовчі ягоди звичайні	Переважають мегатрофні мезофіти: яглиця звичайна, осока волосиста, плющ звичайний, щитник чоловічий; у западинах – розрив-трава звичайна, квасениця звичайна, вороняче око звичайне, тонконіг дібровний, медунка темна, розхідник плющевидний, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний)
Волога букова діброва / D ₃ -бкД	Дуб звичайний (I), бук лісовий і граб звичайний із домішкою ясена звичайного, кленів, ільма, осики, берези повислої	Грабняки, букняки, осичники	Повсюдно; до 500 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі
Волога ялицева діброва / D ₃ -яцД	Дуб звичайний (I) із домішкою ялиці білої, граба звичайного, клена	Яличники, грабняки	Буковина, Прикарпаття, Закарпаття; 350–450 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	гостролистого та явора					
Волога грабова бучина / D ₃ -ГБк	Бук лісовий (I) із домішкою граба звичайного, явора, клена гостролистого	Грабняки, букняки, осичники	Повсюдно; до 600 м н. р. м.	Такі самі	Дуже розріджений: ліщина звичайна, свидина криваво- червона, бруслина бородавчаста	Слаборозвинений: такі самі, як у типі D ₃ -ГД, а також безщитник жіночий, воронець колосистий, підлісник європейський, переліска багаторічна, вербозілля лучне, підмаренник запашний, цирцея звичайна, багаторядник шипуватий, лунарія оживаюча, жеруха залозиста (зубниця залозиста), жеруха бульбиста (зубниця бульбиста), вероніка дібровна, кропива дводомна
Волога чиста бучина / D ₃ -Бк	Бук лісовий (IIa) із невеликою домішкою явора, ільма, клена гостролистого	Грабняки, букняки, осичники	Буковина, Закарпаття, схили північних і північно- східних експозицій; 550–1 000 м н. р. м.	Лісові щебенюваті оглеєні буроземи (потужністю понад 1 м) на елювії-делювії піщано-глинистих сланців	Такий самий	Такі самі
Волога грабово- ялицева бучина / D ₃ -Г-ЯЦБк	Бук лісовий (IIa) із участю ялиці білої, дуба звичайного і граба звичайного	Яличники, грабняки, чисті букняки, ялинники	Повсюдно; 300–500 м н. р. м.	Лісові щебенюваті оглеєні буроземи (потужністю понад 1 м) на елювії-делювії піщано-глинистих сланців	Розріджений: ліщина звичайна, бузина червона та бузина чорна, вовчі ягоди звичайні	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Волога ялицева бучина / D ₃ -яцБк	Бук лісовий (I–Ia) із домішкою ялиці білої, явора, ільма, ясена звичайного	Ялинники	Повсюдно; 500–1 000 м н. р. м.	Лісові буроземи слабооглеєні на елювії піщано- глинистих сланців	Такий самий	Такі самі
Волога тисова бучина / D ₃ -тсБк	Бук лісовий з домішкою граба звичайного, тиса ягідного, ялиці білої, явора, ільма	Не виявлено	Трапляється дуже рідко на Прикарпатті; 300–400 м н. р. м.	Лісові буроземи (потужністю понад 1 м) щебенюваті на елювії-делювії піщано-глинистих сланців, оглеєні	Розріджений: ліщина звичайна, бузина червона та бузина чорна, вовчі ягоди звичайні	Такі самі
Волога ялиново- (смереково-) ялицева бучина / D ₃ -ял-яцБк	Бук лісовий (I–Ia) із домішкою ялиці білої, смереки, явора, клена гостролистого, в'яза, берези повислої та осики	Ялинники, яличники, березняки, осичники	Схили північних і східних експозицій; 700–1 150 м н. р. м.	Такі самі	Слаборозвинений: поодинокі – ліщина звичайна, бузина червона, горобина звичайна	Такі самі
Волога грабово- букова яличина / D ₃ -г-бкЯц	Ялиця біла (I–Ia) із домішкою дуба звичайного, граба звичайного, клена гостролистого, явора	Грабняки, букняки, ялинники, вільшняки	Повсюдно; схили всіх експозицій окрім південних; 350–500 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	У зімкнених насадженнях трав'яно-чагарничковий ярус є бідним; добре розвинений на зрубках: види такі, як у типі D ₃ -гБк
Волога букова яличина / D ₃ -бкЯц	Ялиця біла (I–Ia) із домішкою бука лісового, явора	Ялинники, букняки	Повсюдно; 500–900 м н. р. м.	Такі самі	Такий самий	Такі самі

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Волога ялиново- (смереково-) букова яличина (із фрагментами свіжих підтипів) / D ₃ -ял-бкЯц	Ялиця біла (I–Ia) за участі бука лісового й	Ялинники, букняки, березняки,	Повсюдно, схили північно-східних і південно-західних експозицій; 600–1 000 м н. р. м.	Такі самі, як у типі D ₃ -Бк, але менш щебенюваті, з оглеєним ілювіальним горизонтом	Відсутній або поодинокі: бузина червона, ліщина звичайна, вовчі ягоди звичайні, жимолость чорна	Квасениця звичайна, веснівка дволиста, шавлія залозиста, цирцея альпійська, ожика волосиста, жеруха залозиста (зубниця залозиста), сугайник австрійський, лунарія оживаюча, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), воронець колосистий, живокіст серцевидний, міцеліс стінний, молочай мигдалевидний; папороті: щитник чоловічий, безщитник жіночий, фегоптерис з'єднуючий, голокучник дубовий, пухирник ламкий, багаторядник списовидний
Волога буково- ялицева рамінь (смеречина) / D ₃ -бк-яцЯл	Ялина європейська (I–Ia) із домішкою бука лісового, ялиці білої, явора, клена гостролистого, ільма гірського	Яличники, букняки, березняки	Повсюдно, схили всіх експозицій, крім південних; 750-1 200 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові суглинкові опідзолені щебенюваті на елювії-делювії карпатського фліша	Добре розвинений: горобина звичайна, жимолость чорна, таволга в'язолиста, смородина альпійська	Такі самі
Сира діброва (у комплексі із сугрудуватими підтипами) / D ₄ ³ -Д	Дуб звичайний (I– II) з участю ясена звичайного (I–Ia) і вільхи чорної,	Чорновіль- шняки, ясенники	Повсюдно, часто біля потоків і в блюдоподібних зниженнях;	Дернові слабоопідзолені, важко- і легко- глинисті, з добре	Розріджений: крушина ламка, свидина криваво- червона, клени татарський та польовий,	Переважно мегатрофи-мезофіти та гігрофіти: осоки гостровидна та трясучковидна, жовтець повзучий, ситник розлогий,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення, район (область)	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	граба звичайного, ільма		150–350 м н. р. м.	розвиненим глієвим горизонтом	ліщина звичайна, бруслина європейська	незабудка болотна, гадючник в'язолистий, калюжниця болотна, гірчак перцевий
Сира бучина / D ₄ -Бк	Бук лісовий із домішкою явора, ясена звичайного, граба звичайного, осики; поодинокі – ялина європейська, ялиця біла	Грабняки, осичники, вільшняки	Повсюдно, в поясі букових лісів, зниженні ділянки; 500–900 м н.р.м.	Такі самі	Поодинокі: ліщина звичайна, бузина чорна, бузина червона, бруслина європейська, вовчі ягоди звичайні	Підмаренник болотний, вовконіг європейський, паслін солодко- гіркий, частуха подорожникова, перстач болотний, череда трироздільна, зірочник великоцвітий (з. ланцетовидний), чистець лісовий, жовтець кашубський, жовтяниця черговолиста, аконіт молдавський, хвощ великий, череда трироздільна, розрив- трава звичайна, крем'яник гарний, хвощ лісовий, гравілат річковий, таволжник звичайний
Сира чорновільщина / D ₄ -Вл	Вільха чорна з рідкою домішкою ясеня, ільма, липи, осики, явора, вільхи сірої	Осичники, ясенники	Повсюдно; до 500 м н. р. м.	Дернові, слабоопідзолені з добре розвиненим глієвим горизонтом	Ліщина звичайна, крушина ламка, верба козяча, калина звичайна, вовчі ягоди звичайні	Страусове перо звичайне, теліптерис болотний, горлянка повзуча; характерні мохи: гілокоміум блискучий, гілокоміадельфус трикутний (рігідіадельфус трикутний), плагіомніум хвилястий (зіркомох хвилястий)

- Примітка:** 1. Позначки «А», «В», «С» і «D» означають ступені трофності (родючості) ґрунтів, наприклад, А – бір; В – суббір; С – судіброва, субучина, суяличина, сурамінь (сусмеречина), сучорновільшина, сусіровільшина; D – діброва, бучина, груд, яличина, рамінь (смеречина), чорновільшина.
2. Індеси від 0 до 5 означають ступені вологості ґрунтів, наприклад, 0 – дуже сухий, 1 – сухий, 2 – свіжий, 3 – вологий, 4 – сирий і 5 – мокрий.
3. Позначка «н» означає, що едатоп визначено відповідно до нагірних умов; наприклад, C₃^н-бкДс – волога нагірна букова діброва (із дубом скельним).
-