

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки,
довкілля та сільського господарства
від «__» _____ 2025 року № ____

Уніфікований список і діагностичні ознаки типів лісу корінних (цільових) деревостанів для Гірського Криму

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
<i>Клас типів лісу сосни кримської</i>						
Сухий чорно- сосновий (сосна кримська) бір / A ₁ -Сч	Сосна кримська	Відсутні	Південний округ; 800–1 000 м н. р. м.	Дерново-карбонатні примітивні (потужністю менше ніж 5 см), на делювій- елювій вапняків; осипи та оголення гірських порід	Опис відсутній	Опис відсутній
Дуже сухий чорнососновий (сосна кримська) суббір / B ₀ -Сч	Сосна кримська	3 дуба пухнастого	Південний округ; 50–550 м н. р. м.	Дерново-карбонатні та коричневі слаборозвинені сильноеродовані (потужністю 10–20 см); щебенювато- кам'янистий елювій- делювій вапняків та мергелів	Ялівець високий, сумах дубильний, ялівець червоний, граб східний, скуппія звичайна	Самосил гайовий, круціата п'ємонтська, сонцепвіт сивий, чебрець кримський, осока низька, підмаренник дзвоникovidний, бурачок зонтичний, дорикніум трав'янистий
Сухий ялівцево- чорнососновий (сосна кримська) суббір / B ₁ -явСч	І ярус: сосна кримська (IV); ІІ ярус: ялівець високий і червоний,	Не виявлено	Південний округ; до 650 м н. р. м.	Бурі насичені та слабовилуговані, а також перегнійно- карбонатні	Сумах дубильний, скуппія звичайна, горобина грецька, граб східний, в'язіль	Куцоніжка скельна, осока чорноколоса, жабриця камеденосна, перлівка кримська, дорикніум



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД

Підписувач **Висоцький Тарас Миколайович**
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Мінекономіки



69-06/87559-03 від 15.12.2025

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	дуб пухнастий, граб східний			слаборозвинені або сильноеродовані (потужністю 15-25 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків або глинистих сланцях	емероїдний, жасмин кущовий	трав'янистий, тонконіг неплідний, сонцепвіт сивий, підмаренник дзвоникovidний, дрік білуватий, марена татарська, жабриця вильчаста
Сухий дубово- чорнососновий (сосна кримська) субір / В ₁ -дСч	I ярус: сосна кримська (IV); II ярус: дуб пухнастий	Не виявлено	Південний округ; 650–950 м н. р. м.	Такі самі	Опис відсутній	Опис відсутній
Сухий дубово- змішано-сосновий субір / В ₁ -дСчзм	I ярус: сосна кримська, сосна звичайна; II ярус: дуб скельний	Не виявлено	Північний округ; 350–650 м н. р. м.	Такі самі	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжий дубово- змішано-сосновий субір / В ₂ -дСчзм	I ярус: сосни гачкувата та кримська (III–IV); II ярус: дуб скельний (кущової форми)	Дубняки	Північний округ; 450–850 м н. р. м.	Такі самі	Опис відсутній	Тонконіг дібровний, ожика Форстера, дикранум мітлицевидний, горошок кашубський, осока Галлера, тонконіг неплідний, грястиця збірна, дорикніум трав'янистий; мохи: гілокомій блискучий, гомалотеціум шовковистий
Дуже сухий ялівцево- чорнососновий (сосна кримська) сугруд / С ₀ -явчСч	Сосна кримська, дуб пухнастий, граб східний, ялівець червоний	Не виявлено	Південний округ; до 400 м н. р. м.	Дерново-карбонатні слаборозвинені, коричневі, червоно- бурі, середньоеродовані (потужністю 20-40 см,	Ялівець червоний, жасмин кущовий, суничник дрібноплодний, фісташка туполиста, держидерево	Оман мечолистий, самосил гайовий, самосил білоповстистий, рускус понтійський, чий стоколосовидний, тонконіг неплідний, чебрець

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				скелетністю 30–50 %) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків, мергелів або глинистих сланців	звичайне	Дзевановського, чебрець Кальє, круціата гладенька, чист кримський, лазурник трилопатевий, фибиґія щитовидна, грястиця збірна, бедринець іноземний, березка кантабрійська
Сухий ялівцево-чорнососновий (сосна кримська) сугруд / С ₁ -явчСч	I ярус: сосна кримська (II–III); II ярус: дуб пухнастий (V) із домішкою ялівця червоного, граба східного	Не виявлено	Південний округ; 150–650 м н. р. м.	Опис відсутній	Дерен справжній, скумпія звичайна, шипшина бедренцелиста, шипшина чагарникова, піраканта червона	Ясенець голостовпчиковий, грястиця збірна, куцоніжка скельна, костриця кам'яниста, егоніхон фіолетово-голубий, орляк кримський, осока черноколоса, осока загострена, материнка звичайна, пирій щетинистий, оман мечолистий, рускус понтійський, самосил гайовий, осока пальчаста, головатень руський, дорикніум трав'янистий, перлівка кримська, лазурник трилопатевий, фізосперм корнубійський, псоралея смоляна, дзвоники болонські, ожика Форстера
Сухий дубово-чорнососновий (сосна кримська) сугруд / С ₁ -дСч	I ярус: сосна кримська (II–III); II ярус: дуб скельний (IV–V) із домішкою граба звичайного та інших	Не виявлено	Північний округ; 400–850 м н. р. м., Південний округ; 400–950 м н. р. м.	Коричнево-бурі та червоно-бурі малопотужні, дерново-карбонатні розвинені (потужністю 30-50см) на середньо- та сильноскелетному	Скумпія звичайна, шипшина бедренцелиста, граб звичайний, кизил справжній, сумах дубильний, горобина грецька, ялівець	Лазурник трилопатевий, фізосперм корнубійський, егоніхон фіолетово-голубий, куцоніжка пірчаста, самосил гайовий, грястиця звичайна, тонконіг дібровний, дорикніум трав'янистий, орляк

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				елювії-делювії карбонатних і безкарбонатних порід.	червоний, берека, ожина повстиста, шипшина найболючіша, піраканта червона	кримський, осока чорноколоса, осока низька, оман мечолистий, в'язіль барвистий, головатень руський, псефенус нахилений
Сухий змішано- сосновий сугруд / С ₁ -Счзм	Сосна кримська, сосна гачкувата (II– III)	Не виявлено	Північний округ; 850–1 050 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові малопотужні вилугувані (потужністю 40-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Суха змішано- соснова судіброва / С ₁ -сДзм	Сосна кримська	Не виявлено	Опис відсутній	Бурі, червоно-бурі, коричнево-бурі й ясно- бурі гірсько-лісові малопотужні (потужністю 30-50 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії карбонатних і безкарбонатних порід	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа ялівцево- чорнососнова (сосна кримська) судіброва / С ₂ -яв-счД	Сосна кримська	Не виявлено	Південний округ; 200–500 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Свіжий чорнососновий (сосна кримська) складний сугруд / С ₂ -Счск	I ярус: сосна кримська (I–II); II ярус: дуб скельний (місцями з дубом пухнастим), граб звичайний	Не виявлено	Південний округ; 300–750 м н. р. м.	Опис відсутній	Кизил справжній, клен Стевена, бруслина європейська, скумпія звичайна	Орляк кримський, купина запашна, фізосперм карнубійський, плющ кримський, осока чорноколоса, молочай Вальдштейна, куцоніжка скельна, півонія даурська, молочай мигдалевидний, грястиця збірна, самосил гайовий, золотушник звичайний
Свіжа грабово- чорнососнова (сосна кримська) судіброва / С ₂ -г-счД	I ярус: сосна кримська; II ярус: дуб скельний і граб із домішкою інших порід; III ярус: численні види чагарників	Не виявлено	Південний округ; 350–800 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа змішано- соснова судіброва / С ₂ -счДзм	I ярус: сосни гачкувата та кримська (II–III); II ярус: дуб скельний (IV–V)	Не виявлено	Північний округ; 350–950 м н. р. м.	Бурі та ясно-бурі гірсько-лісові малопотужні карбонатні та слабовилугувані (потужністю 40-60 см) на сильно- і середньоскелетному елювії-делювії глинистих сланців і вапняків	Кизил справжній, бирючина звичайна	Тонконіг дібровний, тонконіг неплідний, ожика Форстера, грястиця збірна, конвалія звичайна, оман мечолистий, ососка пальчаста; мохи: дикран мітлоподібний
Свіжий буково- чорнососновий (сосна кримська)	I ярус: сосна кримська (II–III); II ярус: бук східний	Не виявлено	Південний округ; 600–1 150 м н. р. м., Південно-східний	Бурі гірсько-лісові середньо потужні вилугувані	Кизил справжній, клен польовий, клен Стевена	Орляк кримський, купина запашна, лазурник трилопатевиий, півонія

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
сугруд / С ₂ -бкСч	(III–IV) із постійною участю граба звичайного		округ; 800–950 м н. р. м.	середньоскелетні, буроземно-перегнійно карбонатні розвинені сильно скелетні (потужністю 30-60 см) на елювії-делювії вапняків		даурська, фіалка біла, підмаренник м'який, фізосперм корнубійський, конвалія звичайна, купина східна, жеруха п'ятилиста, тонконіг стиснутий, куцоніжка лісова, переліска багаторічна, плющ кримський, первоцвіт звичайний
Сухий чорнососновий (сосна кримська) складний груд / D ₁ -Счск	Сосна кримська	Не виявлено	Південний округ; 350–600 м н. р. м.	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові середньопотужні ґрунти (потужністю 60-80 см) на слабо- та середньоскелетному елювії	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжий чорнососновий (сосна кримська) складний груд / D ₂ - Счск	I ярус: сосна кримська (I–II) на верхній межі з участю сосни гачкуватої; II ярус: бук східний із грабом та іншими породами	Не виявлено	Південний округ; 350–850 м н. р. м.	Темно-бурі гірсько- лісові потужні вилугувані слабоскелетні ґрунти й буроземно-перегнійно- карбонатні середньоскелетні (потужністю 70-100 см) на слабо- і середньоскелетному елювії	Кизил справжній, клен польовий, бруслина широколиста, берека, піраканта червона	Жеруха п'ятилиста, півонія даурська, конвалія звичайна, плющ кримський, чина золотиста, молочай мигдалевидний, підлісник європейський, тонконіг дібровний, пахучка звичайна, куцоніжка лісова
Свіжий буково- чорнососновий (сосна кримська) груд / D ₂ -бкСч	I ярус: сосна кримська, на верхній межі – з участю сосни	Не виявлено	Північний округ; 750–1 050 м н. р. м., Південний округ; 680–1 150 м н. р. м.	Такі самі	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	гачкуватої; II ярус: бук східний із грабом та іншими породами					
<i>Клас типів лісу сосни піцундської</i>						
Надто сухий сосновий (сосна піцундська) субір / B ₁ -Спц	Сосна піцундська, ялівці високий і червоний	Не виявлено	Південно-східний округ; до 200 м н. р. м.	Коричневі карбонатні слаборозвинені сильноеродовані (потужністю 10-20 см) на сильносkeletalному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Держи-дерево звичайне	Житняк понтійський, бурачок покручений
Дуже сухий сосновий (сосна піцундська) субір / B ₀ -Спц	Сосна піцундська, ялівець високий	Не виявлено	Південно-східний округ; до 220 м н. р. м.	Коричневі фрагментарні, коричневі дерново- карбонатні слаборозвинені сильноеродовані (потужністю 10-30 см) на сильносkeletalному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Опис відсутній	Роман Зефірова, підмаренник тонесенький
Дуже сухий ялівецево-сосновий (сосна піцундська) сугруд / C ₀ -явСпц	Сосна піцундська, дуб пухнастий, ялівець високий	Не виявлено	Південно-східний округ; до 150 м. н. р. м., Південно-західний підокруг; до 150 м. н. р. м.	Коричневі карбонатні малопотужні (потужністю 40-50 см) на сильносkeletalному елювії-делювії вапняків і глинистих	Фісташка туполиста, скупція звичайна, жасмин кущовий, міхурник деревовидний	Пирій щетинистий, солонечник волохатий, асфodelіна кримська, сонццвіт сивий, самосил білоповстистий, чий стоколосовидний, бурачок покручений, астрагал

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				сланців		понтичний, льон Маршалла
Сухий ялівцево- сосновий (сосна піцундська) сугруд / С ₁ -явСпц	Сосна піцундська (III–IV), ялівці високий і червоний, дуб пухнастий, граб східний	Не виявлено	Південно-східний округ; до 300 м н. р. м., Південно-західний підокруг; до 300 м н. р. м.	Такі самі	Держи-дерево звичайне	Ясенець голостовпчиковий, сонцепвіт сивий, костриця кам'яниста, чебрець Кальє, підмаренник тонесенький, самосил гайовий, тонконіг неплідний, чистець германський
<i>Клас типів лісу сосни гачкуватої</i>						
Свіжий сланиково- сосновий (сосна гачкувата) бір / А ₂ -Сгчсл	Сосна гачкувата	Не виявлено	Нагірний округ; 1 100–1 540 м н. р. м.	Нагірні лучно-степові нерозвинені пилювато- щепенюваті (нагірно- примітивні) у комплексі з виходом вапняку й розсипу щебня (потужністю 5- 15 см) на щепенювато- кам'янистому елювії- делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжий березово- сосновий (сосна гачкувата) субір / В ₂ -б-Сгч	Сосна гачкувата, береза повисла (бородавчаста), бук східний, граб звичайний, сосна кримська	Не виявлено	Північний округ; 850–1 200 м н. р. м.	Нагірно-лугові або лугово-степні слаборозвинені вилугувані (потужністю 15-25 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків і пісковиків	Липа серцелиста	Ортилія однобока, підмаренник м'який, тонконіг дібровний, круціата члениста, осока низька, переліска багаторічна; моховий ярус: дикран мітлоподібний, гілокомій блискучий
Свіжий буково- змішано-сосновий субір /	Сосна гачкувата, сосна кримська, бук східний, граб	Не виявлено	Північний округ; 750–1 150 м н. р. м., Південний округ;	Бурі гірсько-лісові й буроземно-перегнійно- карбонатні високогірні	Крушина ламка, горобина грецька	Осока низька, ожика Форстера, ортилія однобока, золотушник звичайний, купина запашна,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
B ₂ -бкСгчзм	звичайний		вище за 1 000 м н. р. м.	слаборозвинені ґрунти (потужністю 20-30 см) на щебенювато- кам'янистому елювії- делювії вапняків		фізосперм корнубійський, тимофіївка степова, підмаренник м'який, кострець прибережний, грястиця збірна
Свіжий прийлинський сосновий (сосна гачкувата) субір / B ₂ ^я -Сгч	Сосна гачкувата	Не виявлено	Північний округ; 950-1 420 м н. р. м.	Нагірно-лучні або лучно-степові слаборозвинені вилугувані (потужністю 15-25 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків і піщаників	Шипшини чатирдага та найколючіша	Тонконіг дібровний, самосил гайовий, кострець прибережний, перлівка поникла, перлівка кримська, круціата члениста, осока низька, підмаренник м'який, гадючник шестипелюстковий, костриця лучна
Свіжий сланиково- сосновий (сосна гачкувата) субір / B ₂ -Сгчсл	Сосна гачкувата	Не виявлено	Нагірний округ; 1 300-1 450 м н. р. м.	Такі самі	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжий змішано- сосновий сугруд / C ₂ -Сгчзм	Сосни гачкувата та кримська (II-III)	Не виявлено	Північний округ; 900-1 200 м н. р. м., Південний округ; 850-1 250 м н. р. м.	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові малопотужні вилугувані (потужністю 40-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Куцоніжка скельна, фізосперм корнубійський, грястиця збірна, осока низька, грушанка зеленоцвіта, пирій середній, переліска багаторічна, перлівка поникла, підмаренник м'який, трясучка середня, кострець прибережний
Свіжий прийлинський сосновий сугруд / C ₂ ^я -Сгч	Сосна гачкувата (V)	Не виявлено	Північний округ; 1 000-1 200 м н. р. м.	Буроземно- перегнійно-карбонатні високогірні й бурі гірсько-лісові	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				малопотужні (потужністю 30-50 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків		
Свіжа змішано- соснова субучина / С ₂ -сгчБкзм	I ярус: сосни гачкувата та кримська (II-III); II ярус: бук східний (III-IV)	Не виявлено	Південний округ; 750-1 250 м н. р. м., Північний округ; 700- 900 м н. р. м.	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові малопотужні вилугувані (потужністю 40-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Граб звичайний	Куцоніжка лісова, лазурник трилопатекий, нечуйвітер споріднений, золотушник звичайний, фізосперм корнубійський, перлівка поникла осока низька, переліска багаторічна, осока пальчаста, підмаренник запашний, грушанка зеленоцвіта; мохи: гілокомій блискучий
Свіжий сланниково- сосновий (сосна гачкувата) сугруд / С ₂ -Сгчсл	Сосна гачкувата	Не виявлено	Нагірний округ; 1 250-1 480 м н. р. м.	Буроземно- перегнійно-карбонатні високогірні й бурі гірсько-лісові малопотужні (потужністю 30-50 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа прийлинська змішано-соснова субучина /	Сосна гачкувата (III-IV), бук східний, граб східний	Не виявлено	Південний округ; 950-1 200 м н. р. м.	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові малопотужні вилугувані	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
C ₂ ^я -сгчБкм				(потужністю 40-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків		
<i>Клас типів лісу ялівецю високого</i>						
Надто сухий фісташково- ялівцевий субір / В ₁ -фЯвв	Ялівець високий, фісташка туполиста, дуб пухнастий, граб східний	Не виявлено	Південно-східний округ; до 300 м н. р. м.	Коричневі сильноеродовані й коричнево-дерново- карбонатні (потужністю 10–20 см) на сильно- щербеноватому елювії- делювії глинистих сланців	Опис відсутній	Опис відсутній
Дуже сухий дубово-ялівцевий субір / В ₀ -дпЯвв	Ялівець високий, ялівець червоний, дуб пухнастий, бук східний	Не виявлено	Південно-східний і Південний округи; до 500 м н. р. м.	Дерново-карбонатні ґрунти й коричневі червонокольорові слаборозвинені середньоскелетні або малопотужні сильноскелетні (потужністю 15-45 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Скуппія звичайна, каперці трав'янисті, міхурник дереовидний та кілікійський, жасмин кущовий, держи- дерево звичайне, фісташка туполиста	Самосил білоповстистий, сонцепвіт верболистий, дрік білуватий, костриця кам'яниста, анізанта неплідна, бурачок Борзи, горошок кашубський, бурачок покручений
Надто сухий фісташково-	Ялівці високий і червоний, фісташка	Не виявлено	Південно-східний і Південний округи;	Коричневі червонокольорові	Фісташка туполиста, держи-дерево	Полин сантонінський, астрагал понтичний, чебрець Кальє,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
ялівцевий сугруд / С ₁ -фЯвв	туполиста, дуб пухнастий, граб східний		до 300 м н. р. м.	малопотужні (потужністю 35-50 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	звичайне, жасмин кущовий	пирій щетинистий, житняк гребінчастий, віниччя сланке, бурачок покручений, березка шовковиста
Дуже сухий дубово-ялівцевий сугруд / С ₀ -дпЯвв	Ялівці високий і червоний, дуб пухнастий, бук східний, граб східний	Не виявлено	Південно- східний і Південний округи; 50-550 м н. р. м.	Коричневі червонокольорові, коричневі дерново- карбонатні розвинені (потужністю 30-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Фісташка туполиста, держидерево звичайне	Костриця кам'яниста, сонццвіт верболистий, бурачок покручений, егілопс яйцевидний, миколайчики польові, волошка неплідна, латук прутяний, чебрець Кальє, самосил білоповстистий, асфodelіна кримська, бромус японський, тонконіг вузьколистий, полин сантонінський, ячмінь цибулястий, самосил гайовий, оман мечолистий, гвоздика Маршалова
Сухий дубово- ялівцевий сугруд / С ₁ -дпЯвв	Ялівці високий і червоний, дуб пухнастий, граб східний	Не виявлено	Південно-східний округ; 100-450 м н. р. м.	Коричневі карбонатні малопотужні і дерново-карбонатні розвинені (потужністю 30-60 см) на різної скелетності елювії- делювії вапняків і глинистих сланців	Шипшина чагарникова	Ясенець голостовпчиковий, самосил гайовий, кардарія крупковидна, миколайчики польові, костриця кам'яниста, бурачок покручений, сонццвіт верболистий
Сухий нагірно- ялівцевий (ялівець)	Ялівець високий	Не виявлено	Нагірний округ (Західний підокруг);	Бурі гірсько- лісостепові остепнені	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
високий) сугруд / С ₁ ^н -Явв			до 900 м н. р. м.	малопотужні (потужністю 40-60 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків		
<i>Клас типів лісу ялівцю смердючого</i>						
Дуже сухий ялівцевий (ялівець смердючий) сугруд / С ₀ -Явс	Ялівець смердючий, дуб скельний, ясен сумахолистий, граб східний	Не виявлено	Опис відсутній	Перегнійно-карбонатні вилугувані поверхнево-кам'янисті (потужністю 30-50 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Клен Стевена, дерен справжній	Перлівка кримська, осока пальчаста, самосил гайовий, лазурник трилопатевиї, материнка звичайна, асфodelіна жовта, ковила найкрасивіша, стоколос каппадокійський
Сухий ялівцевий (ялівець смердючий) сугруд / С ₁ -Явс	Ялівець смердючий, дуб скельний, скупія звичайна	Не виявлено	Опис відсутній	Коричнево-бурі малопотужні (потужністю 40-60 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Кизил справжній, клен Стевена, шипшина бедренцелиста, ясен гостроплідий, граб східний	Куцоніжка пірчаста, перлівка кримська, осока низька, стоколос каппадокійський, ковила найкрасивіша, самосил гайовий, асфodelіна жовта, оман мечолистий, грястиця збірна, псефелус нахилений, костриця кам'яниста, бурачок пухнастий
<i>Клас типів лісу ялівцю притиснутого і ялівцю козачого</i>						
Сухий (у комплексі зі свіжим) сланиково- ялівцевий субір / В ₁ -Явсл	Ялівці притиснутий і козачий	Не виявлено	Ялівець притиснутий: Південний округ; до 1 080 м н. р. м., Нагірний округ (Західний і Східний підокруги);	Нагірні лугово-степові слаборозвинені (потужністю 20-30 см) на елювії-делювії вапняків грубого скелетного складу	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
			960– 1 450 м н. р. м. Ялівець козачий: Нагірний округ (Західний і Східний підокруги); 960– 1 450 м н. р. м.			
<i>Клас типів лісу тамариксів Палласа та чотиритичинкового</i>						
Вологий тамариксовий сугруд / C ₃ -Тм	Тамарикси Палласа та чотиритичинковий	Тамарикс Гогенакера	Заплави річок передгір'я	Алювіально- делювіальні намиті (потужністю 40-60 см) на алювіальних відкладах різного складу	Мірикарія китниковидна	Очерет південний, осока рідкоколоса, м'ята довголиста, ситник розлогий, гравілат алепський, підмаренник чіпкий
<i>Клас типів лісу вільхи чорної</i>						
Вологий чорновільховий груд / D ₃ -Вл	I ярус: вільха чорна (II); II ярус: клен польовий, берест, граб	граб звичайний	Такі самі	Лучно-алювіальні потужні (потужністю 80-120 см) на алювіальних відкладах різного складу	Ліщина звичайна, кизил справжній, в'яз еліптичний, ясен сумахолистий, клен польовий, ожина повстиста	Кострець Бенекена, шавлія залозиста, переліска багаторічна, шоломниця висока, тонконіг дібровний, глуха кропива крапчаста, смірній пронизанolistий
Сирий чорновільховий груд / D ₄ -Вл	Вільха чорна (I–II)	Не виявлено	Такі самі	Лучно-алювіальні заболочені середньопотужні (потужністю 60-80 см) на алювіальних відкладах різного складу	Бузина чорна	М'ята довголиста, вовконіг європейський, просянка розлога, плакун середній, кремена гібридна, жовтець повзучий
Мокрий чорновільховий груд / D ₅ -Вл	Вільха чорна	Верба біла	Такі самі	Лучно-болотні мало- й середньопотужні (потужністю 50-70 см)	Верба пурпурова	Хвощ великий, осока несправжньосмикавцева, ранник тіньовий, ситник

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				на алювіальних відкладах різного складу		розлогий, зніт дрібноквітковий
<i>Клас типів лісу верби білої, верби ламкої, верби прутівидної</i>						
Вологий вербовий груд / D ₃ ³ -B6	Верби біла і ламка	Клен польовий	Такі самі	Лучно-алювіальні потужні (потужністю 80-120 см) на алювіальних відкладах різного складу	Кизил справжній, осика, тамарикс чотиричитинковий	Живокіст кримський, плакун середній, астрагал солодколистий, хвощ великий
Сирий (мокрый) вербовий груд / D ₄ ³ -B6	Верба біла	Верба ламка	Такі самі	Лучно-алювіальні заболочені середньопотужні (потужністю 60-80 см) на алювіальних відкладах різного складу	Відсутній	Осока несправжньосмикацевцева, ситник розлогий, мітлиця повзуча
<i>Клас типів лісу дуба пухнастого</i>						
Дуже сухий грабинниково- дубовий субір / B ₀ -грДп	Дуб пухнастий і граб східний (V)	Не виявлено	Північний округ; 100-400 м н. р. м.	Дерново-карбонатні, коричневі й бурі гірсько-лісо-степові остепновані, сильноеродовані (потужністю 10-20 см) на сильноскелетному елювії-делювії мергелей або глинистих сланців	Ялівець високий, ялівець червоний та ялівець смердючий, грабинник	Опис відсутній
Сухий ялівцево- дубовий субір / B ₁ -явДп	Дуб пухнастий, ялівець високий, ялівець червоний,	Не виявлено	Південно-східний округ; 50-550 м н. р. м.,	Коричневі поверхневокам'яністі й бурі гірсько-	Держи-дерево звичайне	Міхурник кілікійський, бурачок покручений, костриця кам'яниста, асфodelіна жовта,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	граб східний		Південний округ (Південно-західний підокруг); 50-550 м н. р. м.	лісостепові середньороєдовані (потіжністю 15-25 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків		сонцесвіт сивий, пирій щетинистий, тонконіг неплідний, вероніка грицикоплода
Надто суха ялівцево- грабинникова судіброва / С ₋₁ -яв-грДп	Дуб пухнастий, граб східний, ялівець високий, ялівець червоний	Не виявлено	Південно-східний округ; до 300 м н. р. м.	Коричневі малопотужні середньороєдовані (потужністю 35-50 см) на сильноскелетному елювії-делювії безкарбонатних порід	Фісташка туполиста, держидерево звичайне, груша маслинколиста	Костриця кам'яниста, безсмертки однорічні, егілопс яйцевидний, самосил білоповстистий, гвоздика Маршалова, бромус японський, полин шерстистий, миколайчики польові, астрагал колючкуватий, бурачок Борзи
Дуже суха ялівцево- грабинникова судіброва / С ₀ -яв-грДп	Дуб пухнастий, фісташка туполиста (V), у домішці – ялівець високий, граб східний, дуб скельний	Не виявлено	Південно-східний округ; 150-450 м н. р. м.	Коричневі малопотужні й дерново-карбонатні розвинені (потужністю 40-60 см) на сильноскелетному елювії-делювії глинистих сланців, вапняків і мергелів	Держидерево звичайне, скумпія звичайна	Костриця кам'яниста, егілопс яйцевидний, дорикніум трав'янистий, горошок кашубський, полин шерстистий, підмаренник справжній, бурачок покручений, бромус японський, дрік білуватий, деревій благородний, чебрець Дзевановського, чебрець Кальє, самосил білоповстистий, пирій щетинистий, горошок чорний, егілопс дводюймовий, оман очний, безсмертки циліндричні, бромус м'який, бородач звичайний, оман мечолистий, полин кримський

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Дуже суха скумпієва судіброва / C ₀ -скДп	Дуб пухнастий	Не виявлено	Північний округ; 200-500 м н. р. м.	Дерново-карбонатні розвинені й чорноземи малопотужні карбонатні (потужністю 30-60 см) на середньоскелетному елювії-делювії вапняків і мергелей	Опис відсутній	Опис відсутній
Суха ялівцево- грабинникова судіброва / C ₁ -явч-грДп	Дуби пухнастий та скельний, граб східний, ялівець червоний	Не виявлено	Південний округ; 150-550 м н. р. м., Південно-східний округ; 50-450 м н. р. м., Північний округ; 50-400 м н. р. м.	Коричневі та коричнево-бурі гірсько-лісостепові малопотужні, дерново- карбонатні розвинені та сірі степові (потужністю 40-60 см) на сильно- та середньоскелетному елювії-делювії різних порід	Кизил справжній, держидерево звичайне, глід східний	Осока повстиста, костриця кам'яниста, тонконіг вузьколистий, куцоніжка пірчаста, грястиця збірна, кострець прибережний, барвінок трав'янистий, ясенець голостовпчиковий, безсмертки однорічні, бромус японський, підмаренник справжній, псоралея смоляна, осока чорнокоса, тонконіг неплідний, чебрець Кальє, волошка козяча, роман неплідний, самосил гайовий, ячмінь цибулястий, оман очний, бурачок покручений, горлянка хіоська, миколайчики польові, латук прутяний
Суха скумпієва судіброва / C ₁ -скДп	Дуб пухнастий	Не виявлено	Північний округ; 150-650 м н. р. м.	Буроземно- перегнійно-карбонатні середньорозвинені, коричневі	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				малопотужні (потужністю 40-60 см) на сильно- й середньоскелетному елювії-делювії різних порід		
Свіжа іглицева судіброва / C ₂ -ігДп	Дуби пухнастий і скельний, граби звичайний і східний	Не виявлено	Південний округ; до 400 м н. р. м.	Коричнево-бурі та ясно-бурі гірсько- лісостепові середньо- та малопотужні (потужністю 40-60 см) на сильно- й середньоскелетному елювії-делювії різних порід	Шипшина чагарникова, мушмула звичайна, кизил звичайний	Рускус понтійський, тонконіг дібровний, вероніка лікарська, ожика Форстера, первоцвіт звичайний, арум видовжений, підмаренник чіпкий, чина золотиста, осока чорноколоса
Дуже суха ялівцево- фісташкова (ялівець червоний) діброва / D ₀ -явч-фДп	Дуб пухнастий, граб східний, ялівець червоний, фісташка туполиста	Не виявлено	Південно-східний округ; 50–350 м н. р. м.	Темно-коричневі середньопотужні, чорноземи карбонатні передгірські та перегнійно-карбонатні потужні (потужністю 50-80 см) на сильно- та середньоскелетному елювії-делювії різних порід	Скумпія звичайна, держидерево звичайне, груша маслинколиста	Егоніхон фіолетово-голубий, дорикніум трав'янистий, оман мечолистий, бромус японський, егілопс яйцевидний, ячмінь цибулястий, пирій щетинистий, костриця кам'яниста, оман очний, самосил білоповстистий, шандра рання, полин розсічений, бородач звичайний
Дуже суха скумпієва діброва / D ₀ -скДп	Дуб пухнастий (Va)	Не виявлено	Північний округ; 400-450 м н. р. м.	Чорноземи карбонатні та темно-сірі, потужні й середньопотужні (потужністю 60-80 см) на слабоскелетному	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				елювії-делювії вапняків		
Суха іглицева діброва / D ₁ -ігДп	I ярус: дуб пухнастий (IV–V); II ярус: граб східний, іглиця понтійська	Не виявлено	Південний округ; 350 м н. р. м.	Темно-коричневі або бурі гірсько- лісостепові потужні (потужністю 60-100 см) на слабо- та середньоскелетному елювії-делювії карбонатних і безкарбонатних порід	Опис відсутній	Опис відсутній
Суха ялівцево- грабинникова діброва / D ₁ -явч-грДп	Дуби пухнастий і скельний (V–IV), граб східний, ялівець червоний	Не виявлено	Північний округ; 200-480 м н. р. м., Південно-східний округ; 90-560 м н. р. м., Південний округ (Південно-західний підокруг); 150-450 м н. р. м.	Темно-коричневі, коричнево-бурі гірсько-лісостепові, перегнійно-карбонатні сірі потужні й середньопотужні (потужністю 60-100 см) на слабо- й середньоскелетному елювії-делювії карбонатних і безкарбонатних порід	Кизил справжній, ясен гостроплідий, держидерево звичайне, скумпія звичайна, фісташка туполиста, терен колючий	Ясенець голостовпчиковий, егоніхон фіолетово-голубий, підмаренник м'який, півонія даурська, купина багатоквітова, грястиця збірна, пахучка звичайна, переліска багаторічна, тонконіг дібровний, оман німецький, осока Мікелі, тонконіг бульбистий, чистець германський, дорикніум трав'янистий, ряска жовтувата, костриця кам'яниста, залізняк колючий, безсмертки однорічні, самосил білоповстистий
Свіжа пакленово- грабинникова діброва / D ₂ -кп-грДп	Дуб пухнастий, клен польовий, граб східний	Не виявлено	Північний округ; 150-400 м н. р. м., Південно-східний округ;	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
			150-450 м н. р. м.			
<i>Клас типів лісу дуба скельного</i>						
Сухий грабинниково- дубовий субір / В ₁ -грДс	Дуб скельний (Vб), граб східний (Vб)	Не виявлено	Північний округ; 700-1 100 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові сильноеродовані поверхневокам'яністі (потужністю 10-30 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Суха грабинникова судіброва / С ₁ -грДс	Дуб скельний, граб східний	Граб східний	Південний округ; 250-750 м н. р. м., Південно-східний округ; 250-650 м н. р. м., Північний округ; 300-650 м н. р. м.	Коричнево-бурі гірсько-лісостепові, сірі лісостепові й буроземно-карбонатні малопотужні (потужністю 30-50 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Кизил справжній, скуппія звичайна, держидерево звичайне, шипшина чагарникова, груша маслинколиста	Осока Мікелі, фізосперм корнубійський, грястиця збірна, осока розірвана, в'язіль барвистий, оман мечолистий, оман очний, куцоніжка пірчаста, ясенєць голостовпчиковий, миколайчики польові, костриця кам'яниста, бромус японський, тонконіг дібровний, бурачок покручений, шавлія великоквітова
Суха грабова судіброва (дуб скельний) / С ₁ -гДс	Дуб скельний, граб звичайний	Не виявлено	Опис відсутній	Ясно-бурі гірсько- лісові, бурі гірсько- лісостепові малопотужні (потужністю 40-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
				сланців		
Нагірне кленово- грушове рідколісся сухого дубового сугруду / C ₁ ^н -к- гшмДс	Дуб скельний, груша маслинколиста	Не виявлено	Ай-Петрівське нагір'я; 1 100-1 200 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа грабинникова судіброва / C ₂ -грДс	I ярус: дуб скельний (IV–V); II ярус: граб східний	Граб східний, ясен сумахолистий, осика	Північний округ; 400-850 м н. р. м., Південно-західний підокруг і Південно- східний округ; 300-600 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові та буроземно-карбонатні малопотужні вилугувані (потужністю 40-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Кизил справжній, бирючина звичайна, клен польовий	Куцоніжка лісова, ластовень виткий, в'язіль барвистий, алтея коноплевидна, волошка лучна, купина запашна, підмаренник чіпкий, тонконіг дібровний, фізосперм корнубійський, суниці лісові, підмаренник м'який, дорикніум трав'янистий, оман пісковий, осока пальчаста
Свіжа грабова судіброва (дуб скельний) / C ₂ -гДс	Дуб скельний (IV), граб східний (IV)	Граб звичайний, осика	Північний округ; 400-1 000 м н. р. м., Південний округ; 500-800 м н. р. м., Південно-східний округ; 400-750 м н. р. м.	Бурі гірсько-лісові мало- й середньопотужні вилугувані (потужністю 50-70 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Кизил справжній, бирючина звичайна	Тонконіг дібровний, осока Мікелі, горошок кашубський, грястиця збірна, ластовень виткий, в'язіль барвистий, вероніка лікарська, купина запашна, куцоніжка лісова, вероніка тіньова, леукодон білячий, тонконіг дібровний
Свіжа буково- грабова судіброва / C ₂ -бк-гДс	Дуб скельний (III– IV), бук східний, граб східний	Не виявлено	Карабі-нагір'я; 800-900 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Свіжа прийлинська судіброва / C ₂ ^я -Дс	Дуб скельний	Не виявлено	Карабі- нагір'я; 800-900 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Суха грабинникова діброва / D ₁ -грДс	Дуб скельний, граб східний	Ясен сумахолистий, граб східний	Північний округ; 350-800 м н. р. м., Південний округ; 450-900 м н. р. м.	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові та гірсько-лісостепові, буроземні перегнійно- карбонатні, темно-сірі середньопотужні й потужні (потужністю 60-80 см) на слабо- й середньоскелетному елювії-делювії вапняків, глинистих сланців, кристалічних порід	Кизил справжній, мушмула звичайна	Ясенець голостовпчиковий, чина золотиста, грястиця збірна, куцоніжка пірчаста, осока пальчаста, підмаренник м'який, рисівка зеленувата, суниці лісові, молочай мигдалевидний живокіст кримський, кінський часник черешковий, гравілат міський, герань криваво-червона, шавлія вербенова, дорикніум трав'янистий, фізосперм корнубійський
Суха грабова діброва (дуб скельний) / D ₁ -гДс	Дуб скельний (III– IV), липа, ясен звичайний, граб звичайний	Ясен сумахолистий, граб звичайний	Північний округ; 400-1 100 м н. р. м., Південно-східний округ; 400-750 м н. р. м.	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові потужні, темно-бурі чорноземовидні вилугувані (потужністю 60-90 см) на слабо- й середньоскелетному елювії-делювії вапняків, глинистих сланців, кристалічних порід	Кизил справжній, клен Стевена, шипшина чагарникова, липа кавказька, липа серцелиста, бруслина бородавчаста	Куцоніжка пірчаста, осока пальчаста, грястиця збірна, ластовень виткий, тонконіг дібровний, фізосперм корнубійський, лазурник трилопатеви, підмаренник м'який, переліска багаторічна, горошок кашубський, молочай мигдалевидний, егоніхон фіолетово-голубий, суниці лісові, смірній пронизанолистий, підмаренник несправжній, осока повстиста, гравілат міський, кінський часник черешковий

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Суша пакленово- берестова діброва / D ₁ -кп-брДс	Дуб скельний	Не виявлено	Північний округ; 100-350 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Сухий ясеневий груд / D ₁ -Яс	Дуб скельний	Не виявлено	Північний округ; 400-850 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа грабинникова діброва / D ₂ -грДс	I ярус: дуб скельний (III–IV); II ярус: граб східний і клени	Граб східний, ясен сумахолистий, граб звичайний	Північний округ; 400-850 м н. р. м.	Темно-коричневі та бурі гірсько-лісові вилугувані потужні, чорноземи намиті (потужністю 70-100 см) на слабо- та середньоскелетному елювії-делювії вапняків, глинистих сланців, кристалічних порід	Кизил справжній, ліщина звичайна	Ластовень виткий, осока пальчаста, тонконіг дібровний, круціата члениста, молочай мигдалевидний, переліска багато річна, підмаренник чіпкий
Свіжа грабова діброва (дуб скельний) / D ₂ -гДс	I ярус: дуб скельний (III–II), берека; II ярус: граб звичайний, клени польовий і Стевена	Граб звичайний, липа серцелиста, ясен сумахолистий, осика, клен польовий	Північний округ; 450-1 050 м н. р. м., Південно-східний округ; 400-750 м н. р. м., Південний округ; 450-750 м н. р. м.	Темно-бурі та бурі гірсько-лісові вилугувані середньопотужні й потужні, чорноземи намиті, темно-бурі чорноземовидні (потужністю 70-120 см) на слабо- і середньоскелетному елювії-делювії вапняків, глинистих сланців, кристалічних порід	Кизил справжній, ліщина звичайна, берека, глід гладенький	Молочай мигдалевидний, осока Мікелі, ластовень виткий, плющ кримський, підмаренник запашний, грястиця збірна, осока повстиста, купина багатоквіткова, куцоніжка лісова, дорикніум трав'янистий, ферульник кримський, переліска багаторічна, підмаренник несправжній, смірній пронизанолистий, гравілат міський, тонконіг дібровний, первоцвіт звичайний, підмаренник чіпкий, конвалія

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
						звичайна, в'язіль барвистий, чина золотиста, фізосперм корнубійський
Свіжий ясеневий груд / D ₂ -Яс	Ясен сумахолистий	Дуб скельний, граб звичайний, клен польовий, бук східний	Північний округ; 650-1 000 м н. р. м.	Опис відсутній	Кизил справжній, липа кавказька, клен Стевена	Смірний пронизанолистий, тонконіг дібровний, фіалка запашна, переліска багаторічна, ластовень виткий, шоломниця висока, куцоніжка пірчаста, рисівка зеленувата, підмаренник м'який, грястиця збірна
Свіжа буково- грабова діброва / D ₂ -бкс-гДс	Дуб скельний (III– II), бук східний (III)	Бук східний, граб звичайний, липа кавказька, ясен сумахолистий	Північний округ; 450-940 м н. р. м., Південно-східний округ; 600-750 м н. р. м.	Опис відсутній	Бруслина широколиста, кизил справжній	Ластовень виткий, осока пальчаста, купина східна, суниці лісові, плющ кримський, тонконіг дібровний, коручка морозниковидна, підмаренник запашний, переліска багаторічна, куцоніжка лісова, гравілат міський, фізосперм корнубійський, чина золотиста, півонія даурська
Свіжа прийлинська діброва / D ₂ ^я -Дс	Дуб скельний	Не виявлено	Північний захід і північний схід I ґряди 950-1 050 м н. р. м.	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Волога грабова діброва (дуб скельний) / D ₃ -гДс	Дуб скельний	Граб звичайний, ясен сумахолистий,	Південний округ; 200-700 м н. р. м., Північний округ; 300-650 м н. р. м.	Лучні перегнійно- карбонатні наносні (потужністю 80-140 см) на слабо- і	Кизил справжній, ліщина звичайна, осика, клен польовий, верба	Куцоніжка лісова, шавлія залозиста, первоцвіт звичайний, м'ята довголиста, гадючник шестицелюстковий,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
		груша звичайна		середньоскелетному делювії і алювії різного складу	козяча, свидина криваво-червона, вільха чорна, бук східний, глід гладенький	вовконіг європейський, гравілат міський, переліска багаторічна, чистець лісовий, кропива дводомна, цикорій дикий
<i>Клас типів лісу бука східного</i>						
Свіжий нагірний буковий субір / B ₂ ^H -Бкс	Бук східний (V)	Не виявлено	Опис відсутній	Бурі нагірно-лісові слаборозвинені вилугувані (потужністю 15-30 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа грабова субучина / C ₂ -гБкс	I ярус: бук східний (III); II ярус: граб звичайний (IV)	Граб звичайний	Опис відсутній	Бурі й яснобурі гірсько-лісові вилугувані, опідзолені, буроземно-перегнійно- карбонатні малопотужні (потужністю 30-60 см) на середньо- та сильноскелетному елювії-делювії вапняків і глинистих сланців	Липа кавказька, осика	Підмаренник запашний, тонконіг дібровний, молочай мигдалевидний, ластовень виткий, купина багатоквіткова, нечуйвітер споріднений, плющ кримський, ортілія однобока, купина пахуча, вероніка лікарська, переліска багаторічна, осока пальчаста, грястиця збірна, золотушник звичайний; мохи: гілокомій блискучий
Свіжа дубово- грабова субучина / C ₂ -д-гБкс	I ярус: бук східний (III), дуб скельний (III–IV); II ярус: граб звичайний	Не виявлено	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Свіжа прийлинська субучина / С ₂ ^я -Бкс	Бук східний (V–Va)	Не виявлено	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Рідколісся груші маслинколистій свіжого сугруду / С ₂ -Гшм	Бук східний, груша маслинколиста	Не виявлено	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Нагірне кленово- грушове криволісся свіжого сугруду / С ₂ ^н -кГшмкр	Бук східний, груша маслинколиста	Не виявлено	Опис відсутній	Буроземно- перегнійно-карбонатні вилугувані малопотужні (потужністю 40-60 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа нагірна субучина / С ₂ ^н -Бкс	Бук східний	Не виявлено	Опис відсутній	Бурі гірсько-лісові опідзолені (потужністю 30-50 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Волога грабова субучина (бук східний) / С ₃ -гБкс	Бук східний	Граб звичайний, осика, вільха чорна	Опис відсутній	Буроземно-лугові вилугувані (потужністю 40-60 см) на алювіально- делювіальних відкладеннях	Ліщина звичайна, верба козяча	Жеруха п'ятилиста, шавлія золотиста, ластовень виткий, міцеліс стінний, костріць Бенекена, тонконіг дібровний, булатка червона, жовтець повзучий
Волога прийлинська субучина / С ₃ ^я -Бкс	Бук східний	Не виявлено	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Волога нагірна субучина / C ₃ ^н -Бкс	Бук східний	Не виявлено	Опис відсутній	Бурі гірсько-лісові опідзолені середньо- та малопотужні (потужністю 50-70 см) на сильноскелетному елювії-делювії вапняків	Опис відсутній	Опис відсутній
Нагірне грабове криволісся вологого сугруду / C ₃ ^н -Гкр	Бук східний	Не виявлено	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа грабова бучина (бук східний) / D ₂ -гБкс	I ярус: бук східний (I–II), ясен звичайний; II ярус: граб звичайний	Граб звичайний, ясен сумахолистий	Опис відсутній	Темно-бурі та бурі гірсько-лісові вилугувані, опідзолені, середньопотужні та потужні, буроземно- перегнійно-карбонатні високогірні (потужністю 60-120 см) на елювії-делювії карбонатних і безкарбонатних порід різної скелетності	Липа кавказька, клен польовий, осика, дерен справжній	Підмаренник запашний, жеруха п'ятилиста, булатка червона, переліска багаторічна, молочай мигдалевидний, підмаренник чіпкий, чистець лісовий, щитник чоловічий, осока пальчаста, фіалка запашна, грястиця збірна, куцоніжка лісова, тонконіг дібровний, ластовень виткий, коручка морозниковидна, купина багатоквіткова, плющ кримський, купина пахуча, чина золотиста, півонія даурська
Свіжа дубово- грабова бучина / D ₂ -дс-гБкс	I ярус: бук східний (II–III), дуб скельний (III); II ярус: граб звичайний	Дуб скельний, граб звичайний	Опис відсутній	Опис відсутній	Ясен сумахолистий, кизил справжній	Жеруха п'ятилиста, молочай мигдалевидний, підмаренник запашний, купина

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
						широколиста, переліска багаторічна, первоцвіт звичайний, підлісник європейський, конвалія звичайна, підмаренник чіпкий, грястиця збірна, глуха кропива крапчаста
Свіжа прийлинська бучина / D ₂ ^я -Бкс	Бук східний (III– IV)	Не виявлено	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа нагірна бучина / D ₂ ^н -Бкс	I ярус: бук східний (IV–V); II ярус: граб звичайний	Ясен сумахолистий, граб звичайний	Опис відсутній	Темно-бурі нагірно- лісові, буроземно- перегнійно- карбонатні вилугувані (потужністю 60-80 см) на елювії-делювії карбонатних і безкарбонатних порід різної скелетності	Клен Стевена	Переліска багаторічна, підмаренник запашний, молочай м'який, фіалка запашна, купина запашна, первоцвіт звичайний, конвалія звичайна
Волога грабова бучина (бук східний) / D ₃ -гБкс	Бук східний (I–II), ясен звичайний, граб звичайний	Ясен сумахолистий, граб звичайний	Опис відсутній	Бурі й темно-бурі гірсько-лісові вилугувані опідзолені (потужністю 70-100 см) на елювіально- делювіальних відкладах вапняків	В'яз еліптичний	Жеруха п'ятилиста, осока пальчаста, булатка червона, переліска багаторічна, щитник чоловічий, чорнокорінь германський, підмаренник запашний, плющ кримський, просянка розлога, кропива двodomна, підмаренник чіпкий, шавлія золотиста, купина запашна, підлісник європейський

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Волога гірсько- долинна бучина/ D ₃ ^{Г-Д} -Бкс	I ярус: бук східний (II–III); II ярус: граб звичайний	Граб звичайний	Опис відсутній	Лучно-алювіальні, глибоко-дерново- карбонатні та лучно- лісові (потужністю 70- 120 см)	Ясен сумахолистий, клен польовий, кизил справжній, ліщина звичайна, в'яз еліптичний, груша звичайна, осика	Шоломниця висока, підмаренник запашний, цирцея звичайна, переліска багаторічна, шавлія залозиста, первоцвіт звичайний, плющ кримський, осока пальчаста, суниці лісові, костріць Бенекена, герань Робертова, кропива дводомна
Волога прийлинська бучина / D ₃ ^Я -Бкс	Бук східний (III– IV), граб звичайний, ясен звичайний	Граб звичайний	Опис відсутній	Опис відсутній	Ясен сумахолистий	Підмаренник запашний, тонконіг дібровний, щитник чоловічий, оман блошинний, молочай мигдалевидний, мерінгія трижилкова, костріць прибережний, костриця велетенська, осока пальчаста, приворотень дрібноквітковий

Примітка: 1. Позначки «А», «В», «С» і «D» означають ступені трофності (родючості) ґрунтів, наприклад, А – бір; В – субір; С – судіброва, субучина, сугруд; D – діброва, бучина, груд.
 2. Індeksi від -1 до 5 означають ступені вологості ґрунтів, наприклад, -1 – надто сухий, 0 – дуже сухий, 1 – сухий, 2 – свіжий, 3 – вологий, 4 – сирий і 5 – мокрий.
 3. Позначки «Г-Д», «Н» і «Я» означають, що едатопи визначено відповідно до гірсько-долинних, нагірних умов та умов кримських яйл; наприклад, D₃^{Г-Д}-Бкс – волога гірсько-долинна бучина, С₃^Н-бкДс – волога нагірна букова діброва (із дубом скельним) та D₃^Я-Бкс – волога прийлинська бучина.