

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки,
довкілля та сільського господарства
від «__» _____ 2025 року № ____

Уніфікований список і діагностичні ознаки заплавних типів лісу корінних (цільових) деревостанів для рівнинної частини України

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
<i>Полісся</i>						
Свіжий сосновий бір / А ₂ ³ -С	Сосняки із сосни звичайної (І–ІІІ)	Не виявлено	Залишки борової тераси, конуси виносів прируслової та центральної заплави	Дернові примітивні піщані. РГВ – 4 м і більше	Не виявлено	Ожика бліда, куничник наземний, нечуйвітер волохатий, сон широколистий, аґалік трава гірська, чебрець повзучий
Вологий осокоревий субір / В ₃ ³ -Т	Осокорники (ІІ-ІІІ)	Не виявлено	Знижені ділянки прируслової заплави	Дернові піщано- мулуваті. РГВ – 1,5-2,0 м	Не виявлено	Стоколос безостий, чихавка хрящувата, тонконіг лучний, жовтеці повзучий і отруйний, куничник очеретяний, перестріч звичайний
Свіжа в'язова судіброва / С ₂ ³ -взД	І ярус: дуб звичайний, ясен звичайний (ІІІ- ІV); ІІ ярус: в'яз,	В'язівники, осичники	Підвищені ділянки прируслової заплави	Дерново-опідзолені малогумусовані на шаруватих	Ліщина звичайна, свидина криваво- червона, жостір	Хвилівник звичайний, розхідник плющевидний, гравілат міський, холодок лікарський, конвалія



ДОКУМЕНТ СЕД Мінекономіки АСКОД
Підписувач **Висоцький Тарас Миколайович**
Сертифікат 6FA97849F1B2570D04000000125C0200A1050800
Дійсний з 31.07.2025 14:11:56 по 31.07.2027 14:11:56

Мінекономіки



69-06/87559-03 від 15.12.2025

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
	зрідка – груша звичайна, яблуня лісова			супіщаних відкладах. РГВ – 3-3,5 м	проносний, бруслина європейська, горобина звичайна	звичайна, в'язіль барвистий, тонконіг дібровний, хвощ лісовий, хвощ зимуючий
Вологий тополевий сугруд / C ₃ ³ -Тб	I ярус: тополя біла (I– II); II ярус: в'яз, дуб звичайний, груша звичайна	Низькопроду к-тивні дубняки, в'язівники	Середньовисокі гриви та схили прируслової заплави	Дернові шаруваті, у нижній частині слабооглеєні	Бруслина європейська, ожина сиза, вишня магалебська, свидина криваво-червона, крушина ламка, чагарникові верби	Хвощ лісовий, підмаренник чіпкий, розхідник плющевидний, хвилівник звичайний, вербозілля лучне, герань Робертова, розрив- трава звичайна
Сирий чорновільховий сугруд/ C ₄ ³ -Вл	Вільха чорна (II– III)	Вільшняки	Притерасна заплава; межа із центральною заплавою; прируслова частина заплави	Лучні лучно- болотні оторфовані ґрунти, торф'янисті ґрунти	Опис відсутній	Опис відсутній
Свіжа в'язово- ясенева діброва / D ₂ ³ -вз-яД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний (I-III); II ярус: берест, в'яз, клен гостролистий, липа серцелиста, осика	В'язівники, осичники, берестяники, ясенники	Підвищені ділянки центральної заплави	Дерново- опідзолені, лучно- лісові на крейджано- вапнякових відкладеннях	Ліщина звичайна, бруслини європейська і бородавчата, свидина криваво-червона, жостір проносний, бузина чорна, клен татарський	Розхідник плющевидний, медунка темна, купина багатоквіткова, копитняк європейський, гравілат міський, підмаренник запашний, зірочник ланцетовидний, конвалія звичайна, тонконіг дібровний
Волога в'язово-	I ярус: дуб звичайний,	Ясенники,	Рівні, дещо знижені	Дерново-	Ліщина звичайна,	Кропива дводомна, розхідник

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
ясенева діброва / D ₃ ³ -вз-яД	ясен звичайний (I-II); II ярус: в'яз, берест, клен гостролистий, липа серцелиста, осика, вільха чорна (I- II)	вільшняки, березняки	ділянки центральної заплави	опідзолені, лучно- лісові опідзолені на крейдіяно- вапнякових відкладаннях, що підстилаються піском. РГВ - 1,5-2 м	свидина криваво- червона, бруслина європейська, глід кривостовпчиковий, ожина сиза, калина звичайна, рідше черемха пташина, смородина чорна, вишня магалебська	плющевидний, осока лісова, переліска багаторічна, яглиця звичайна, чистець лісовий, фіалка Рейхенбаха, підмаренник чіпкий, герань Робертова, хвощ лісовий, розрив-трава звичайна, глуха кропива плямиста
Волога в'язова діброва / D ₃ ³ -взД	I ярус: дуб звичайний, в'яз, липа серцелиста (I-II); II ярус: в'яз, липа серцелиста, осика, зрідка – тополя чорна, вільха чорна	В'язівники, осичники, липняки, осокирники	Середньовисокі гриви прируслової заплави	Дерново- опідзолені, лучно- лісові опідзолені на суглинкових, супіщаних оглеєних підстиленнях. РГВ – 2,0-2,5 м	Ліщина звичайна, свидина криваво- червона, бруслина європейська, жостір проносний, ожина сиза	Кропива дводомна, гравілат міський, хвощ лісовий, конвалія звичайна, хвилівник звичайний, розрив-трава звичайна, ранник вузлуватий, герань Робертова, підмаренник чіпкий, паслін солодко-гіркий
Свіжа грабова діброва / D ₂ ³ -гД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний (II); II ярус: граб звичайний із домішкою липи серцелистої, клена гостролистого, в'яза, береста, осики	Ясенники, грабняки, осичники	Рівні, пологі ділянки центральної заплави	Лучно-лісові сильноопідзолені на карбонатних породах, що підстилаються піщаним, супіщаним алювієм	Ліщина звичайна, бруслини європейська та бородавчаста, свидина криваво- червона	Гравілат міський, копитняк європейський, купина багатоквіткова, медунка темна, підмаренник запашний, розхідник плющевидний, осока волосиста, зірочник ланцетовидний, просянка розлога, фіалка дивна, яглиця

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
						звичайна
Волога грабова діброва / D ₃ ³ -гД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний (I-II); II ярус: граб звичайний, зрідка – клен гостролистий, липа серцелиста, в'яз, берест, осика	Грабняки, осичники, вільшняки	Відносно рівні ділянки центральної заплави	Лучно-лісові опідзолі. РГВ – 1,7-2,0 м	Ліщина звичайна, свидина криваво- червона, бузина чорна, ожина сиза, бруслина європейська, крушина ламка, горобина звичайна, калина звичайна	Кропива дводомна, вороняче око звичайне, герань Робертова, гравілат міський, підмаренник чіпкий, осока лісова, розхідник плющевидний, переліска багаторічна, яглиця звичайна, розрив-трава звичайна
Сирий тополево- вербовий груд / D ₄ ³ -тчВб	Деревостани верби з домішкою тополі чорної, в'яза (I)	Осокорники, вербняки	Знижені ділянки прируслової заплави	Дерново-глеєві. РГВ – 0,9-1,8 м	Бруслина європейська, крушина ламка, чагарникові верби, ожина сиза	Чистець болотний, кропива дводомна, плетуха звичайна, хміль звичайний, підмаренник болотний, валеріана лікарська, вербозілля звичайне
Мокрий вербовий груд / D ₅ ³ -Вб	Вербняки (I)	Не виявлено	Найнижчі ділянки прируслової заплави, старі русла й заболочені водотоки	Лучно-болотні. РГВ – 0,5-0,8 м	Відсутній або чагарникові верби (лози)	Чистець болотний, стрілолист звичайний, частуха подорожникова, м'ята водяна, вовконіг європейський, вербозілля звичайне, незабудка болотна, живокіст лікарський, шоломниця звичайна, сідач коноплевий, вех широколистий
Сирий	Вільшняки з	Не виявлено	Притерасна заплава	Лучно-болотні	Бруслина європейська,	Кропива дводомна, щитник

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
чорновільховий груд / D ₄ ³ -Вл	незначною домішкою берези повислої, інколи – в'яза, дуба звичайного, ясена звичайного (I-II)		та найвіддаленіші від русла ділянки центральної заплави	оторфовані. РГВ – 0,8-1,2 м	свидина криваво- червона, бузина чорна, калина звичайна, ожина сиза, крушина ламка	чоловічий, вовконіг європейський, щучник дернистий, череда трироздільна, плетуха звичайна, жабрій звичайний, хміль звичайний, вербозілля звичайне
Мокрий чорновільховий груд / D ₅ ³ -Вл	Вільшняки з незначною домішкою берези повислої (I-II)	Не виявлено	Притерасна заплава	Лучно-болотні, болотні оторфовані. РГВ – 0,1-0,5 м	Калина звичайна, свидина криваво- червона	Комиш лісовий, вовконіг європейський, вербозілля звичайне, хміль звичайний, череда трироздільна, очерет південний, паслін солодко- гіркий, теліптерис болотний, рогози вузьколистий і широколистий, підмаренник болотний, лепеха, півники болотні, омег водяний
<i>Лісостеп</i>						
Свіжий сосновий бір / A ₂ ³ -С	Сосняки із сосни звичайної (I-II)	Не виявлено	Найвищі рівні ділянки прирусової заплави, конуси виносів центральної заплави	Дернові примітивні піщані	Не виявлено	Куничник наземний, сон широколистий, дзвоники круглолісті, костриця овеча, нечуйвітер зонтичний
Свіжий	Осокірники (II-III)	Не виявлено	Схили прирусової	Дернові мулисто-	Не виявлено	Стоколос безостий, очиток

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
осоковий субір / B_2^3 -Тч			заплави	піщані слабощаруваті		великий, пирій повзучий, герань лучна, гусятник малий, жовтець їдкий
Свіжа берестова судіброва / C_2^3 -брД	I ярус: дуб звичайний, берест (II-III), II ярус: в'яз, клен татарський	Берестняки, осичники, тополевики	Рівні ділянки прируслової та центральної заплави	Дерново-лучні малопотужні, лучні супіщані легкосуглинкові шаруваті. РГВ – 3,5-5,0 м	Ліщина звичайна, свидина криваво- червона, жостір проносний, бруслина європейська, клен татарський	Сerpій красильний, герані лучна і криваво-червона, стокolos безостий, айстра солончакова, дрік красильний
Свіжа кленово- липова судіброва / C_2^3 - к-лД	I ярус: дуб звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста (II- III); II ярус: липа серцелиста, клен гостролистий	Липняки, тополевики	Рівні ділянки прируслової заплави	Лучно-дернові супіщані шаруваті, малопотужні лучні. РГВ – 2,5-5,0 м	Ліщина звичайна, клен татарський, свидина криваво-червона, глід одноматочковий	Розхідник шорсткий, зірочник ланцетовидний, тонконіг вузьколистий, серпій красильний, гравілат міський, пахучка звичайна, материнка звичайна, конвалія звичайна
Волога кленово- липова судіброва / C_3^3 -к-лД	I ярус: дуб звичайний, клен гостролистий, липа серцелиста (II); II ярус: липа серцелиста, клен гостролистий, клен польовий	Липняки, тополевики, пакленовики	Дещо знижені ділянки прируслової заплави	Лучно-дернові малопотужні, лучні, шаруваті, слабооглеєні. РГВ – 1,5-2,5 м	Ліщина звичайна, клен татарський, крушина ламка	Тонконіг лучний, вовконіг європейський, мітлиця біла, перстачі повзучий і гусячий
Свіжий тополевий	Тополя біла (I-II)	Рідко – штучні	Рівні ділянки прируслової	Лучно-дернові, супіщані.	Не виявлено	Полин звичайний, стокolos безостий, пижмо звичайне,

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
сугруд / C ₂ ³ -Тб		сосняки	заплави	РГВ – 3,5-5,0 м		розхідник плющевидний, гравілат міський
Вологий вербово- тополевий сугруд / C ₃ ³ - вбТб	Верба біла, тополя біла (I-II)	Не виявлено	Знижені ділянки прируслової заплави	Лучно-дернові, лучні малопотужні, в нижній частині оглеєні. РГВ – 1,5-2,0 м	Відсутній	Борщівник сибірський, конвалія звичайна, осока рання, тонконіг лучний
Сирий вербовий сугруд / C ₄ ³ -В	Вербняки (I-III)	Не виявлено	Найнижчі ділянки прируслової та центральної заплави, старики, водотоки	Лучні, лучно- болотні шаруваті супіщано-глинисті оглеєні. РГВ – 0,7-1,0 м	Крушина ламка, калина звичайна, чагарникові верби	Шоломниця звичайна, вех широколистий, м'ята водяна, кропива дводомна, авран лікарський, вербозілля звичайне
Сирий вільховий сугруд / C ₄ ³ -Вл	Вільшняки (II)	Не виявлено	Ділянки притерасної заплави	Лучно-болотні, болотні, торф'янисті. РГВ – 0,4-0,7 м	Крушина ламка, черемха пташина, верби козяча й сіра, ліщина звичайна	Кропива дводомна, теліптерис болотний, безщитник жіночий, щитник шартрський, вех широколистий, гадючник в'язолистий, частуха подорожникова, вовконіг європейський
Мокрий вільховий сугруд / C ₅ ³ -Вл	Вільшняки (II)	Не виявлено	Ділянки притерасної заплави	Лучно-болотні, болотні, торф'янисті. РГВ – 0-0,4 м	Калина звичайна, верба сіра	Теліптерис болотний, кропива дводомна, плакун верболистий, кизляк китицецвітний, ситники розлогий та скупчений

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Свіжа берестово- пакленова діброва та її галогенні варіанти / D ₂ ³ -бр-кпД	I ярус: дуб звичайний, берест, ясен звичайний (I-II); II ярус: клен польовий, берест, в'яз	Берестняки, в'язівники, тополевики, пакленовики	Відносно рівні ділянки центральної заплави	Лучні, інколи опідзолені, зернисті суглинкові. РГВ – 2,5-4,0 м	Клен татарський, ліщина звичайна, свидина криваво- червона, жостір проносний, бузина чорна, бруслини бородавчаста та європейська, бирючина звичайна	Розхідник пліщевидний, зірочник ланцетовидний, яглиця звичайна, конвалія звичайна, копитняк європейський, хвилівник звичайний, очеретянка звичайна, підмаренник запашний
Свіжа берестово- ясенева діброва / D ₂ ³ -бр-яД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний (I-II); II ярус: берест, в'яз, липа серцелиста	Берестняки, ясенники, липняки	Таке саме	Лучні опідзолені суглинкові на крейдіяно- вапнякових відкладеннях. РГВ – 2,1-5,0 м	Ліщина звичайна, свидина криваво- червона, бруслина європейська, бузина чорна	Опис відсутній
Волога берестово- ясенева діброва / D ₃ ³ -бр-яД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний, берест (I-II); II ярус: в'яз, липа серцелиста, осика	Ясенники, берестняки, липняки, вільшняки	Знижені ділянки центральної заплави	Лучні опідзолені на крейдіяно- вапнякових відкладеннях. РГВ – 1,5-2,0 м	Ліщина звичайна, свидина криваво- червона, бруслина європейська, калина, рідше черемха пізня, смородина чорна, ожина сиза, вишня магалєбська	Кропива дводомна, розхідник, ожина сиза, яглиця, чистець лісовий, фіалка лісова, підмаренник, герань Робертова, хвощ лісовий, розрив-трава звичайна
Волога берестово-	I ярус: дуб звичайний, берест, в'яз, ясен	Берестняки, в'язівники,	Рівні, дещо знижені ділянки	Лучні, інколи опідзолені	Бузина чорна, калина звичайна, ожина сиза,	Конвалія звичайна, чистець лісовий, фіалка висока, зеленчук

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
пакленова діброва та її галогенні варіанти / D ₃ ³ -бр-кпД	звичайний (І-ІІ); ІІ ярус: клен польовий, берест, в'яз	тополевики, осичники	центральної заплави	суглинкові слабооглеєні. РГВ – 1,5-2,5 м	крушина ламка, бруслина європейська	жовтий, вовконіг європейський, яглиця звичайна
Сирий чорновільховий груд / D ₄ ³ -Вл	Вільшняки (І-ІІ) із домішкою ясена звичайного (болотного екотипу)	Не виявлено	Ділянки притерасної заплави	Лучно-болотні, болотні, торф'янисті. РГВ – 0,4-0,7 м	Калина звичайна, черемха пташина, бузина чорна	Кропива дводомна, зірочник дібровний, розрив-трава звичайна, хвилівник звичайний, жовтяниця черволиста
Мокрий чорновільховий груд / D ₅ ³ -Вл	Вільха чорна, ясен звичайний (болотний екотип) (І-ІІ)	Не виявлено	Ділянки притерасної заплави	Болотні, оторфовані. РГВ – 0-0,3 м	Калина звичайна, черемха пташина, бузина чорна, смородина чорна	Частуха подорожникова, вех широколистий, лепеха звичайна, гадючник в'язолистий, кропива дводомна, рогози вузьколистий та широколистий, комиш лісовий, їжача голівка пряма
<i>Степ</i>						
Свіжий сосновий бір / A ₂ ³ -С	Сосняки	Не виявлено	Найвищі ділянки прирусової заплави, конуси виносів	Дернові примітивні, супіщані. РГВ - 5 м і більше	Відсутній, зрідка – зіновать руська	Мітлиця виноградникова, ожика бліда, сон широколистий, куничник наземний, чебрець повзучий, тонконіг дібровний
Свіжий осокоревий субір / B ₂ ³ -Тч	Осокірники	Не виявлено	Рівні, дещо підвищені ділянки, схили гривистих	Дернові шаруваті, наносні: прошарки піску значно (в 4-6	Не виявлено	Пирій повзучий, стоколос безостий, куничник наземний, гусятник малий, жовтець

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
			підвищень	разів) переважають тонкі прошарки (1-2 см) легкого супіску з гумусом		багатоквітковий
Вологий осоколевий субір / В ₃ ³ -Т	Осокірники (І-ІІ)	Не виявлено	Знижені ділянки прируслової заплави	Дернові, дерново- лучні, супіщані, шаруваті. РГВ – 1,5-2,0 м	Не виявлено	Осока рання, пирій повзучий, хвилівник звичайний, тонконіг лучний, холодок лікарський
Свіжий тополевий сугруд / С ₂ ³ -Тб	Тополя біла (І-ІІ), осокір (І-ІІ) із домішкою дуба звичайного, береста, в'яза	Дубняки, берестняки	Підвищені ділянки прируслової заплави	Лучно-дернові, супіщані, легкосуглинкові, шаруваті. РГВ – 2,5-3,5 м	Бруслина європейська	Конвалія звичайна, полин звичайний, гравілат міський, паслін солодко-гіркий, борщівник сибірський, пижмо звичайне
Свіжа берестова судіброва та її галогенний варіант / С ₂ ³ -брД	Дуб звичайний, берест (ІІІ-ІV)	Берестняки, в'язівники, тополівники	Рівні ділянки прируслової або центральної заплави	Дерново-лучні малопотужні лучні супіщані, легкосуглинкові, шаруваті. РГВ – 3,0-5,0 м	Клен татарський, жостір проносний, свидина криваво-червона, бруслина європейська	Кермек Гмеліна, хвилівник звичайний, серпій увінчаний, герань лучна, гравілат міський
Вологий вербово- тополевий сугруд / С ₃ ³ -вбТб	Верба біла, тополя біла, осокір (І-ІІ), домішка в'яза, береста	Не виявлено	Найнижчі ділянки прируслової заплави	Лучно-дернові легкосуглинкові слабооглеєні. РГВ – 1,5-2,5 м	Терен колючий, свидина криваво-червона, чагарникові верби, ожина сиза	Стоколос безостий, кропива дводомна, борщівник сибірський, кремена гібридна, полин звичайний, паслін солодкогіркий

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Свіжа берестово- пакленова діброва та її галоґенні варіанти / D ₂ ³ -бр-кпД	I ярус: дуб звичайний, берест (II-III); II ярус: клен польовий, берест, в'яз, груша звичайна, яблуня лісова, липа серцелиста	Дубняки, осичники, берестняки, тополевики	Рівні ділянки центральної заплави	Лучні суглинкові потужні, суглинкові (у нижній частині профілю – часто слабооглеєні). РГВ – 2,5 м	Клен татарський, жостір проносний, бруслини європейська та бородавчата, ожина сиза	Борщівник сибірський, фіалка дивна, гравілат міський, розхідник плющевидний, тонконіг звичайний, буги́ла лісова, серпій увінчаний, вербозілля лучне, підмаренники чіпкий і мареновидний
Волога берестово- пакленова діброва та її галоґенні варіанти / D ₃ ³ -бр-кпД	I ярус: дуб звичайний, берест, ясен звичайний, тополя біла (I-II); II ярус: клен польовий, липа серцелиста, берест, в'яз, осика	Дубняки, ясенники, берестняки, тополевики, осичники	Пласкі, дещо знижені ділянки центральної заплави	Лучні суглинкові потужні зернисті, у нижній частині – оглеєні. РГВ – 1,5-2,0 м	Клен татарський, жостір проносний, ожина сиза, бруслини європейська та бородавчата	Кропива дводомна, серпій увінчаний, зірочник ланцетовидний, чистець лісовий, вербозілля лучне, череда трироздільна, підмаренник чіпкий, хміль звичайний, дзвоники кропиволисті, шоломниця звичайна, вовконіг європейський
Свіжа берестово- ясенева діброва / D ₂ ³ -бр-яД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий, берест (I-II); II ярус: ясен звичайний, берест, клен гостролистий, липа серцелиста	Дубняки, ясенники, липняки	Рівні ділянки центральної заплави	Лучні потужні суглинкові зернисті, включення карбонатів (мергель, крейда). РГВ – 2,5-5,0 м	Бруслини європейська та бородавчата, ожина сиза, жостір проносний, клен татарський	Борщівник сибірський, фіалка дивна, гравілат міський, розхідник плющевидний, тонконіг звичайний, буги́ла лісова, серпій увінчаний вербозілля лучне, підмаренники чіпкий і мареновидний

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
Волога берестово- ясенева діброва / D ₃ ³ -бр-яД	I ярус: дуб звичайний, ясен звичайний, липа серцелиста, клен гостролистий (I); II ярус: ясен звичайний, клен польовий, яблуня лісова	Дубняки, ясенники, липняки	Пласкі, дещо знижені ділянки центральної заплави	Лучні потужні важкосуглинкові зернисті із включеннями карбонатів, у нижній частині оглеєні. РГВ – 1,5-2,0 м	Клен татарський, ожина сиза, жостір проносний, бруслини європейська та бородавчата	Кропива дводомна, серпій увінчаний, зірочник ланцетовидний, чистець лісовий, вербозілля лучне, череда трироздільна, підмаренник чіпкий, хміль звичайний, дзвоники кропиволисті, шоломниця звичайна, вовконіг європейський
Сирий вербовий груд / D ₄ ³ -Вб	Верба біла (I)	Не виявлено	Старики, знижені ділянки прируслової та центральної заплави	Лучні важкосуглинкові оглеєні. РГВ – 0,5-1,0 м	Ожина сиза	Живокіст лікарський, вовконіг високий, чистець болотний, вех широколистий, конюшина суницеподібна
Сирий чорновільховий груд / D ₄ ³ -Вл	Вільха чорна (I-II), рідко болотний екотип ясена звичайного	Не виявлено	Притерасна заплава	Лучно-болотні, болотні оторфовані. РГВ – 0,5-1,0 м	Калина звичайна, бузина чорна, череуха пташина, крушина ламка	Шоломниця звичайна, авран лікарський, самосил часниковий, кропива жабрієлиста, бекманія звичайна, осоки, ситники розлогий та скупчений, перстач повзучий, мітлиця повзуча, живокіст лікарський
Мокрий чорновільховий груд / D ₅ ³ -Вл	Вільха чорна (Ia-I)	Не виявлено	Притерасна заплава	Болотні, торф'янисті. РГВ – 0,1-0,5 м	Калина звичайна, бузина чорна, череуха пташина	Гадючник в'язolistий, гірчак перцевий, живокіст лікарський, плаунець заплавної, теліптерис

Назва типу лісу / індекс типу лісу	Корінні (цільові) деревостани (клас бонітету)	Похідні деревостани	Топографічне положення	Ґрунти, рівень ґрунтових вод (РГВ)	Підлісок	Індикатори й константні види живого надґрунтового покриву
1	2	3	4	5	6	7
						болотний, лепешняк великий

- Примітка:** 1. Позначки «А», «В», «С» і «D» означають ступені трофності (родючості) ґрунтів, наприклад, А – бір; В – суббір; С – судіброва, сугруд; D – діброва, груд.
2. Індeksi від 2 до 5 означають ступені вологості ґрунтів, наприклад, 2 – свіжий, 3 – вологий, 4 – сирий і 5 – мокрий.
3. Позначка «з» означає, що едатоп визначено відповідно до умов заплав, наприклад, С₂^з -Тб – свіжий тополевий сугруд.
-